



ຢາສັກ ປ້ອງກັນ ໄວຣັສທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເນື້ອງອກເຍື່ອບຸ ຜິວໃນມະນຸດ (HPV)

ເຈ້ຍຂໍ້ມູນສໍາລັບພໍ່ແມ່

ກົມ ອະນາໄມ ແຫ່ງຣັດ ນຊວ ສະເໜີການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກທີ່ ສະພາການຄົ້ນຄວ້າດ້ານສຸຂະພາບແລະ ການແພດແຫ່ງຊາດໄດ້ແນະນຳສໍາລັບໂຄງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກສໍາລັບພວກວັຍໜຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ. ຕ້ອງມີໜັງສືຍິນຍອມທີ່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງເຊັນຮັບ.

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ

- ອ່ານເຈ້ຍຂໍ້ມູນ ນີ້ໃຫ້ດີ.
- ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ລູກທ່ານໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ເນື້ອງອກເຍື່ອບຸຜິວໃນມະນຸດ (HPV) ຈົ່ງຂຽນຕື່ມຟອມຍິນຍອມແລ້ວ ເອົາຟອມຍິນຍອມທີ່ທ່ານເຊັນຮັບແລ້ວໃຫ້ລູກທ່ານນຳກັບໄປໃຫ້ໂຮງຮຽນ.
- ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ລູກຂອງທ່ານສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ HPV, ບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຍິນຍອມ.

- 25% ຂອງມະເຮັງປາກຊ່ອງຄອດ
- 50% ຂອງມະເຮັງທີ່ອະວັຍວະເພດຊາຍ

ການສັກຢາໃຫ້ຜູ້ຊາຍຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເປັນມະເຮັງ ໃນ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ການເປັນຫູດທີ່ອະວັຍວະເພດ ແລະ ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ມັນຍັງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນພວກຜູ້ຍິງຈາກການເປັນໂຣກມະເຮັງປາກມົດລູກອີກດ້ວຍ.

ຖ. ຢາວັກຊີນທໍາການຢ່າງໃດ?

ຢາວັກຊີນທໍາການໂດຍການໄປກະຕຸ້ນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດເຊື້ອໂຣກບາງຢ່າງ. ຖ້າວ່າຄົນຜູ້ນີ້ທີ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກແລ້ວມີການສໍາຜັດກັບການຕິດ ເຊື້ອໂຣກເຫຼົ່ານີ້ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງພວກ ເຂົາກໍຈະສາມາດຕອບຮັບໄດ້ໂດຍມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງການປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອໂຣກ ຫຼື ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງມັນໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ຖ. ຢາວັກຊີນໃດທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້?

ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຣກ HPV ອັນດຽວ ທີ່ປ້ອງກັນໂຣກ HPV 9 ປະເພດ (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ແລະ 58).

ຖ. ລູກຂ້ອຍຕ້ອງສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ HPV ຈັກເຊັມ?

ການຄົ້ນຄວ້າສາກົນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຢາວັກຊີນ HPV ເຂັມໜຶ່ງໃຫ້ການປົກປ້ອງຄືກັນກັບການສັກສອງເຂັມ. ອີງຕາມຫຼັກຖານນີ້, ກຸ່ມທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການຂອງອອສເຕຣເລຍກ່ຽວກັບການສັກຢາກັນໂຣກ (ATAGI) ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ອອສເຕຣເລຍຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຕາຕະລາງວັກຊີນ HPV ຄັ້ງດຽວໃນປີ 2023.

ວັຍລຸ້ນບາງຄົນທີ່ມີພູມຕ້ານທານບົກພ່ອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແມ່ນແນະນຳໃຫ້ສັກວັກຊີນ HPV ສາມເຂັມ. ຕາຕະລາງຂະໜາດຍາ 3ເຂັມ ຕ້ອງໃຫ້ມີຊ່ວງເວລາຫ່າງກັນ 2 ເດືອນລະຫວ່າງຢາ ເຂັມ1 ແລະເຂັມ 2, ແລະ 4 ເດືອນລະຫວ່າງເຂັມ2 ແລະ ເຂັມ 3.

ພາວະພູມຕ້ານທານບົກພ່ອງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ມີ:

- ພູມຕ້ານທານຂຶ້ນຕົ້ນ ຫຼືຮອງ (ສານຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອໂຣກໃນຮ່າງກາຍ ເມັດເລືອດຂາວ B ແລະ ເມັດເລືອດຂາວ T ບົກພ່ອງທັງໝົດ ຫຼືບາງສ່ວນ)
- ການຕິດເຊື້ອ HIV
- ຄົນທີ່ເປັນມະເຮັງ
- ການປູກຖ້າອະໄວຍະວະ
- ໂຣກແພ້ພູມຄຸ້ມກັນຕົວເອງ
- ການປິ່ນປົວດ້ວຍການກົດພູມຕ້ານທານທີ່ສໍາຄັນ (ບໍ່ລວມ asplenia ຫຼື hyposplenia).

ຖ. HPV ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນແພ່ຜ່າຍໄດ້ຢ່າງໃດ?

ໄວຣັສເນື້ອງອກເຍື່ອບຸຜິວໃນມະນຸດ (HPV) ເປັນໄວຣັສທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທັງເພດຍິງແລະເພດຊາຍ. HPV ແພ່ຜ່າຍຜ່ານ ການສໍາຜັດອະໄວຍະວະເພດ ໃນຂະນະທີ່ມີເພດສໍາພັນກັບ ຄົນທີ່ມີເຊື້ອໄວຣັສນີ້ແລ້ວ. ເຊື້ອໄວຣັສນີ້ຈະຜ່ານເຂົ້າໄປທາງຜິວໜັງທີ່ຂາດພຽງເລັກນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດແພ່ຜ່າຍທາງເລືອດ ຫຼື ທາງນໍ້າອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍ. ຖ້າອະນາໄມສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ແຕ່ພຽງບາງສ່ວນ ເພາະ ວ່າ ມັນບໍ່ທໍ່ເອົາຜິວໜັງທຸກໆບ່ອນຂອງອະວັຍວະເພດ.

ບໍ່ແມ່ນ HPV ທຸກປະເພດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້. ຫຼາຍຄົນທີ່ມີການຕິດເຊື້ອ HPV ຈະບໍ່ຮູ້ເລື່ອງນີ້.

HPV ບາງຊະນິດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຕຸ່ມຢູ່ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ. ນີ້ລວມເຖິງບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ (ປາກຊ່ອງຄອດ, ຊ່ອງຄອດ, ປາກມົດລູກ, ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ, ໜ່ວຍອັນທະ, ຮູທະວານ, ແລະ ບໍລິເວນທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງທະວານໜັກແລະອະໄວຍະວະເພດ(perineum)). ປົກກະຕິແລ້ວຕຸ່ມມັກຈະບໍ່ເຈັບປວດ, ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຄັນ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍຕົວ. ປະເພດຂອງ HPV ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຕຸ່ມແມ່ນເອີ້ນວ່າ 'ຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ' ເພາະວ່າພວກມັນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມະເຮັງ.

HPV ຊະນິດອື່ນໆແມ່ນເອີ້ນວ່າ 'ຄວາມສ່ຽງສູງ' ເພາະວ່າພວກມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຈຸລັງກ່ອນເປັນມະເຮັງຂະຫຍາຍ ຕົວໄດ້. ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະກາຍເປັນມະເຮັງຖ້າປະໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.

HPV ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງ 5% ທົ່ວໂລກ, ລວມທັງ:

- ເກືອບໝົດທຸກກໍລະນີຂອງມະເຮັງປາກມົດລູກ
- 90% ຂອງມະເຮັງທະວານໜັກ
- 78% ຂອງມະເຮັງທີ່ອະວັຍວະເພດຍິງ
- 60% ຂອງມະເຮັງຄໍ (ມະເຮັງຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງຮູຄໍ, ລິ້ນ ແລະ ຕ່ອມທອນຊິລ)

ຖ. ຈະເປັນແນວໃດກັບວັກຊີນທີ່ໄດ້ສັກຢາເຂັມໜຶ່ງແລ້ວ?

ບັນດານັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ HPV 1ເຂັມແລ້ວ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສັກເຂັມທີສອງ. ພວກເຂົາໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນເຖິງປັດຈຸບັນແລະຢ່າງເຕັມ ແລ້ວ.

ການກວດປາກມົດລູກແບບກັນກອງຢ່າງສມໍ່າ ສເມີ (ແຕ່ກ່ອນເອີ້ນວ່າແພັບສະເມີຍ) ກໍຍັງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ສໍາລັບບັນດາຜູ້ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາແລ້ວ, ເພາະວ່າວັກຊີນ ປ້ອງກັນໂຮກ HPV ນີ້ບໍ່ປ້ອງກັນທຸກໆປະເພດຂອງໂຮກ HPV ທີ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໂຮກມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ້. ຜູ້ຍິງ ໝົດ ທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຈາກ25ປີທີ່ເຄີຍມີເພດສໍາພັນມາແລ້ວ ຄວນມີການກວດປາກມົດລູກແບບກັນກອງໃນທຸກໆ 5ປີ, ໂດຍ ບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານະການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ HPV ຂອງ ພວກເຂົາ.

ຖ. ໃຜຄວນສັກວັກຊີນ?

ນັກຮຽນທຸກໆຄົນທີ່ຢູ່ຊັ້ນ ປີ 7 ແລະ ສູນພາສາອັງກິດແບບເລັ່ງລັດ ທັງໝົດ ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 12 ປີ ຄວນໄດ້ຮັບວັກຊີນ HPV ຂະໜາດດຽວ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານສາທາລະນະສຸກ 1300 066 055.

ຖ. ແມ່ນໃຜທີ່ບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢານີ້?

ຢາວັກຊີນ HPV ບໍ່ຄວນສັກໃຫ້ຜູ້ທີ່:

- ຖືພາ ຫຼື ອາດຈະຖືພາ
- ເຄີຍມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຫຼັງຈາກການສັກຢາຄັ້ງກ່ອນ
- ເຄີຍມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຕໍ່ສ່ວນປະສົມໃດນຶ່ງຂອງຢາສັກ (ຈັດເປັນລາຍການຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ)
- ເຄີຍມີປັດຈຸບັນອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຕໍ່ເຊື້ອຢີດສ໌

ຖ. ຢາວັກຊີນມີປະສິດທິຜົນເທົ່າໃດ?

ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກນີ້ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອປະເພດສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງໂຮກ HPV ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນໂຮກມະເຮັງປາກມົດລູກຫຼາຍກວ່າ 90 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນບັນດາຜູ້ຍິງແລະ ນອກ ຈາກນີ້ກໍຍັງປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອປະເພດ ອື່ນໆ ຕື່ມຂອງໂຮກ HPV ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນໂຮກມະເຮັງໃນບັນດາຜູ້ຊາຍອີກດ້ວຍ.

ການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວັກຊີນດັ່ງກ່າວຍັງໃຫ້ການປ້ອງກັນເກືອບເຖິງ 100% ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຫຼັງຈາກໄດ້ສັກຢາແລ້ວ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການແນະນໍາໂຄງການການສັກຢາປ້ອງກັນ HPV ແຫ່ງຊາດ (ໃນປີ 2007 ສໍາລັບແມ່ຍິງແລະ 2013 ສໍາລັບຜູ້ຊາຍ) ປະກົດການຂອງ:

- ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງປາກມົດລູກລະດັບສູງໃນກຸ່ມອາຍຸທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບວັກຊີນຫຼຸດລົງເກືອບ 50%
- ຕຸ່ມຢູ່ອະໄວຍະວະເພດໃນວັຍໜຸ່ມສາວ (ຕໍ່າກວ່າ 21 ປີ) ຫຼຸດລົງ 90%.

ຍ້ອນວ່າມະເຮັງປາກມົດລູກມັກຈະພັດທະນາໃນໄລຍະ 10 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ບົດບາດຂອງຢາວັກຊີນໃນການຫຼຸດຜ່ອນມະເຮັງປາກມົດລູກຈະບໍ່ປາກົດຜົນໃຫ້ເຫັນ ເປັນເວລາດົນພໍ່ຄວນ.

ອຸບັດການຂອງມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັບຕັ້ງແຕ່ໂຄງການກວດພະຍາດປາກມົດລູກແບບຄັດກອງແຫ່ງຊາດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 1991 ແລະ ໂຄງການວັກຊີນປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສ Papilloma Virus (HPV) ແຫ່ງຊາດໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີໃນປີ 2007.

ຖ. ຖ້າຂ້ອຍຢາກລໍຖ້າຈົນກວ່າລູກຊາຍຂ້ອຍໃຫຍ່ກວ່ານີ້ເດຈະເປັນຫຍັງບໍ່?

ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ HPV ນີ້ຈະມີປະສິດ ທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເມື່ອສັກໃຫ້ຄົນວັຍໜຸ່ມກ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະມີເພດສໍາພັນ. ຢາສັກນີ້ສາມາດເອົາໃຫ້ໄດ້ຢູ່ພຽງແຕ່ໃນໂຮງຮຽນດ້ວຍການສົ່ງຕົ້ນສບັບຟອມຍິນຍອມໃນຂະນະທີ່ລູກທ່ານຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ. ຖ້າທ່ານເລືອກທີ່ຈະລໍຖ້າ ຈົນກວ່າລູກທ່ານໃຫຍ່ກວ່ານີ້ ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດນັດໝາຍສັກຢາກັບນາຍໝໍຂອງທ່ານ ຫຼື ເພສັດຊາອນພູມດ້ານທານ.

ຖ້າສັກວັກຊີນຜ່ານຈີພີ ຫຼືນັກປຸງຢາ, ການສັກຢາວັກຊີນຈະຟຣີ, ແຕ່ທ່ານອາດຈະຕ້ອງເສັຍຄ່າການປຶກສາຫາລື.

ຖ. ຢາສັກກັນໂຮກ HPV ບັນຈຸຫຍັງແດ່?

ຢາສັກນີ້ ບັນຈຸ ເຊື້ອຢີດສ໌ ຢາເສີມອາລູມິນຽມ sodium chloride, L-histidine, polysorbate ແລະ sodium borate. ສ່ວນປະສົມດັ່ງກ່າວນີ້ມີຢູ່ໃນຢາສັກກັນໂຮກ ປະຣິມານນ້ອຍທີ່ສຸດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຢາກັນໂຮກທໍາການ ຫຼື ທໍາໜ້າທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຢາເສັຍ.

ຖ. ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກປອດໄພເທົ່າໃດ?

ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກຢູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍນີ້ແມ່ນປອດໄພຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານການກວດກາຢ່າງເຄັ່ງຄັດໂດຍ ອົງການຄວບຄຸມຢາເພື່ອການບໍາບັດ (TGA) ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ອົງການ (TGA) ຍັງໄດ້ຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພຂອງຢາສັກໃນເວລາທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ອີກດ້ວຍ.

ຖ. ອາການຂ້າງຄຽງຂອງການສັກຢາກັນໂຮກ ມີຫຍັງແດ່?

ອາການຂ້າງຄຽງ ມີພຽງເບົາບາງ ແລະ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຈະມີອາການເຈັບໃຄ່ ແລະ ເປັນຮອຍແດງຕາມບໍຣິເວນສັກຢາ. ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ຮ້າຍແຮງນັ້ນມີນ້ອຍທີ່ສຸດ. ບັນດາພໍ່ແມ່ທີ່ຢູ່ໃນຣັດ NSW ທີ່ໄດ້ຖືກຕິດຕາມເບິ່ງຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກ HPV ໄດ້ລາຍງານວ່າ ນັກຮຽນຕໍ່າກວ່າ 11% ມີອາການຂ້າງຄຽງທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ ໃນຂະນະທີ່ມີພຽງ 0.5% ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຕ້ອງການການຮັກສາພະຍາບານ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆ ມີໄວ້ໃຫ້ທີ່ ກອງຂໍ້ມູນເລື່ອງຢາສໍາລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ [Consumer Medicine Information (CMI)] ສໍາລັບຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກແມ່ນມີໄວ້ທີ່ www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination. ບັນດາພໍ່ແມ່ທີ່ເປັນກົງວົນກ່ຽວກັບອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆຫຼັງຈາກການສັກຢານັ້ນ ຄວນຕິດຕໍ່ນາຍໝໍຂອງພວກເຂົາຜູ້ຊຶ່ງຈະເປັນຜູ້ລາຍງານໄປຫາພະແນກສຸຂະພາບ ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ.

ຖ. Anaphylaxis (ອາການແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ) ແມ່ນຫຍັງ?

Anaphylaxis ແມ່ນອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສລົບ ແລະ ຕາຍໄດ້ຖ້າບໍ່ປິ່ນປົວໃຫ້ໄວ. ມັນຈະເກີດໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ ຫຼັງຈາກການສັກຢາ. ພວກພະຍາບານທີ່ເຮັດວຽກດ້ານ ການສ້າງພູມດ້ານທານໂຮກຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນກໍໄດ້ຮັບການເຝິກຫັດມາແລ້ວເປັນຢ່າງດີໃນການປິ່ນປົວອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງນີ້

ຖ. ລູກສາວຂ້ອຍຍັງຕ້ອງມີການກວດ ປາກມົດລູກແບບຄັດກອງ ບໍ່?

ແມ່ນແລ້ວ. ການກວດປາກມົດລູກແບບກັນກອງຢ່າງສມໍ່າ ສເມີ (ແຕ່ກ່ອນເອີ້ນວ່າແພັບສະເມີຍ) ກໍຍັງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ສໍາລັບບັນດາຜູ້ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາແລ້ວ, ເພາະວ່າວັກຊີນ ປ້ອງກັນໂຮກ HPV ນີ້ບໍ່ປ້ອງກັນທຸກໆປະເພດຂອງໂຮກ HPV ທີ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໂຮກມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ້.

ຜູ້ຍິງ ໝົດ ທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຈາກ25ປີທີ່ເຄີຍມີເພດສໍາພັນມາແລ້ວ ຄວນມີການກວດປາກມົດລູກແບບກັນກອງໃນທຸກໆ 5ປີ, ໂດຍ ບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານະການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ HPV ຂອງ ພວກເຂົາ.

ຖ. ຖ້າລູກຂ້ອຍເປັນໂຮກທິດ ແລະ ກິນຢາ ກອັກຕີໂຊນ ຫຼື ເປຣັດນິໂຊນ ດ້ວຍການໃຊ້ “ອັນເປີ່ນ” ເດ?

ຢາວັກຊີນ ສາມາດສັກໃຫ້ໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ເປັນໂຮກທິດໄດ້ໂດຍປອດໄພ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະພວມກິນຢາຫຍັງ.

ແມ່ນໃຜສາມາດຍິນຍອມຕໍ່ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ແລະ ຈະສາມາດຖອນການຍິນຍອມໄດ້ບໍ?

ມີແຕ່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຍິນຍອມຕໍ່ການສັກ ຢາປ້ອງກັນໂຮກ ສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18ປີ. ນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸ 18ປີແລະຫຼາຍກວ່າ ອາດຈະຍິນຍອມຕໍ່ການ ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄວນຂຽນ ຕື່ມ ພ້ອມທັງເຊັນຟອມຍິນຍອມບ່ອນທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ‘ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ’. ການ ຍິນຍອມສາມາດຖືກຖອນຄືນໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍການແຈ້ງໄປຫາທາງໂຮງຮຽນເປັນ ລາຍລັກອັກສອນ ເລື່ອງການຖອນການຍິນຍອມ ຫຼື ໂທຣະສັບຫາໂຮງຮຽນເພື່ອ ຖອນການຍິນຍອມນັ້ນ.

ຖ. ຄວນສັກຢາກັນໂຮກນີ້ແກ່ນັກຮຽນຍິງທີ່ຖືພາຫຼື ຄິດວ່າລາວອາດຈະຖືພາ ບໍ?

ບໍ່. ນັກຮຽນຍິງຜູ້ໃດທີ່ຖືພາ ຫຼື ຄິດວ່າລາວອາດຈະຖືພາບໍ່ຄວນສັກຢາກັນ ໂຮກນີ້. ໃນວັນທີ່ເປີດຄລິນິກ ພະຍາບານສັກຢາຈະຖາມບັນດານັກຮຽນຜູ້ຍິງ ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຖືພາ ຫຼື ຄິດວ່າອາດຈະຖືພາຫຼືບໍ່.

ຖ້າຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນຕໍ່ຄໍາຖາມນີ້ວ່າ ແມ່ນ ລາວກໍຈະບໍ່ໄດ້ສັກຢາ. ນັກຮຽນກໍຈະຖືກແນະນຳໃຫ້ປົກສາຫາລື ບັນຫານີ້ກັບພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂອງລາວ ແລະ ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການແພດໃນທັນທີ. ນອກຈາກນີ້ລາວຍັງຈະໄດ້ຮັບຮາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ຂອງບໍຣິການການສັ່ງ ຕໍ່ດ້ານສຸຂພາບຊຶ່ງຈະໃຫ້ຄໍາແນະນຳ ການອຸ້ມອຸ້ມ ແລະ ການຊີ້ນຳ.

ຖ. ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດຖ້າລູກຂ້ອຍພາດຈາກການສັກຢາທີ່ໂຮງຮຽນ ຍ້ອນເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ຂາດໂຮງຮຽນໃນມື້ທີ່ພະຍາບານມາ?

ຖ້າວ່າພາດການສັກຢາປ້ອງກັນ HPV ຢູ່ໂຮງຮຽນ, ຄວນທໍາການສັກເທົ່າທີ່ ຈະໄວໄດ້. ໂຮງຮຽນບາງແຫ່ງຈະຈັດຄລິນິກການສັກຢາໃຫ້ທັນ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ພໍ່ແມ່ຄວນຕິດຕໍ່ກັບນາຍໝໍທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາຫຼື ນັກປຸງຢາເພື່ອ ຈັດການສັກຢາ.

ຖ. ຂ້ອຍຈະເຂົ້າເຖິງບັນທຶກການສັກຢາໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນຂອງລູກທ່ານຈະຖືກອັບໂຫຼດໃສ່ທະບຽນ ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ (AIR) ເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະຫວັດການ ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງລູກທ່ານ.

ບັນດາພໍ່ແມ່ສາມາດຂໍສຳເນົາໃບລາຍງານປະຫວັດການສັກຢາ AIR ຂອງ ລູກພວກເຂົາໄດ້ທຸກເວລາ ຈົນຮອດລູກພວກເຂົາອາຍຸ 14 ປີຂຶ້ນໄປ, ແລະ ນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸ 14 ປີຂຶ້ນໄປສາມາດຂໍໃບປະກາດປະຫວັດການສັກ ຢາດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ນຳໃຊ້ບັນຊີMedicare online ຜ່ານ myGov my.gov.au/
- ນຳໃຊ້ແອັບ Medicare Express Plus App www.servicesaustralia.gov.au/express-plus-mobile-apps
- ໂທຫາສາຍສອບຖາມທົ່ວໄປ AIR ທີ່ເບີ 1800 653 809.

ຖ. ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຂໍ້ມູນຂອງລູກຂ້ອຍ?

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານເອົາໃຫ້ຢູ່ຟອມຍິນຍອມການສັກຢາກັນໂຮກ ນັ້ນຈະມີເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ຖືເປັນຄວາມລັບ ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນກົດໝາຍ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດທີ່ມີຢູ່ໃນກົດໝາຍຂອງຣັດ NSW ແລະ ຣັຖບານກາງ (ເບິ່ງຢູ່ໃນ ຄໍາຖແລງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ຄັດຕິດມາ).

ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຖືກເອົາເຂົ້າໃສ່ໄວ້ຢູ່ໃນກອງທະບຽນການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ຂອງກົມອານາໄມ ຣັດ NSW ແລະ ແລ້ວກໍຈະຖືກອັບໂຫຼດເຂົ້າໄປຫາ ກອງ ລົງທະບຽນ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກແຫ່ງ ອອສເຕຣເລຍ (AIR) ເພື່ອ ວ່າຈະສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໄປຫາປະຫວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຂອງລູກ ທ່ານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ MyGov.

ບັນດານັກຮຽນຍິງທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ HPV- ໂດຍການ ເຊັນຟອມຍິນຍອມນັ້ນ, ແມ່ນທ່ານໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃນການເປີດເຜີຍ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂພາບຂອງລູກທ່ານເພື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າຫາ ໂຄງການ ລົງທະບຽນການກວດມົດລູກແຫ່ງຊາດໃນອະນາຄົດ.

ຖ. ຂ້ອຍຈະຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຢູ່ໃນ ໂຮງຮຽນໄດ້ຈາກໃສ?

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມມີໄວ້ໃຫ້:

- ໂດຍການເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຕ໌ຂອງກົມອະນາໄມແຫ່ງຣັດ ນຊວ ທີ່:www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
- ໂດຍການຕິດຕໍ່ ພະແນກ ອະນາໄມຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ທີ່ເບີ 1300 066 055.

Human papillomavirus (HPV) vaccine Parent Information Sheet

October 2023 © NSW Health. SHPN (HP NSW) 230689-1-15



ໃຫ້ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ
ຊື່ຂອງນັກຮຽນ (ຕົວຢ່າງ: JANE SMITH)

ໃຫ້ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ
ຊື່ຂອງນັກຮຽນ (ຕົວຢ່າງ: JANE SMITH)

ສໍາລັບຫ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ

ສໍາລັບຫ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ

ແຂນ ຊ້າຍ ເວລາຂອງການສັກຢາ (24ຊົ່ວໂມງ) ໝາຍເລກຂອງຢາສັກ ຂມາດຢາ 1
ຂວາ

ແຂນ ຊ້າຍ ເວລາຂອງການສັກຢາ (24ຊົ່ວໂມງ) ໝາຍເລກຂອງຢາສັກ
ຂວາ

ລາຍເຊັນຂອງພະຍາບານ ວັນທີ
2 0

ລາຍເຊັນຂອງພະຍາບານ ວັນທີ
x

ຄວາມເຫັນຂອງພະຍາບານ

ເຫັນຜົນທີ່ບໍ່ສັກຢາ

- ຂາດໂຮງຮຽນ
- ປະຕິເສດ
- ບໍ່ສະບາຍ
- ບໍ່ມີລາຍເຊັນ
- ຖອນການຍິນຍອມ
- ອື່ນໆ

ຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນ
ກະລຸນາຂຽນຕື່ມ
ຟອມຍິນຍອມນັ້ນເປັນ
ພາສາອັງກິດ



ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກ ຄໍຕິບ ໂຮກບາດທະຍັກ ແລະ ໂຮກໄອໄກ່ (dTpa)

Diphtheria, tetanus and pertussis (dTpa) vaccine

ກົມ ອະນາໄມ ແຫ່ງຣັດ ນຊວ ສະເໜີການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ທີ່ ສະພາການຄົ້ນຄວ້າດ້ານສຸຂພາບແລະການແພດແຫ່ງຊາດໄດ້ ແນະນຳສໍາລັບໂຄງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກສໍາລັບພວກວັຍໜຸ່ມ ໃນໂຮງຮຽນ. ຕ້ອງມີໜັງສືຍິນຍອມທີ່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງເຊັນຮັບ.

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ

- ອ່ານເຈ້ຍຂໍ້ມູນ ນີ້ໃຫ້ດີ.
- ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ລູກທ່ານໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຄໍຕິບ, ໂຮກບາດທະຍັກ ແລະ ໂຮກ ໄອໄກ່ ຈົ່ງຂຽນຕື່ມຟອມຍິນຍອມ ແລ້ວເອົາຟອມຍິນຍອມທີ່ທ່ານເຊັນຮັບແລ້ວໃຫ້ລູກທ່ານນຳກັບໄປ ໃຫ້ ໂຮງຮຽນ.
- ຖ້າທ່ານ ບໍ່ ຕ້ອງການໃຫ້ລູກທ່ານສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ຄໍຕິບ, ໂຮກບາດທະຍັກ ແລະ ໂຮກ ໄອໄກ່ ຢ່າ ຂຽນຕື່ມຟອມຍິນຍອມນັ້ນ ຫຼື ສົ່ງຟອມກັບໄປໃຫ້ໂຮງຮຽນ.

ຖ. ໂຮກ ຄໍຕິບ ໂຮກບາດທະຍັກ ແລະ ໂຮກໄອໄກ່ ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຮກຄໍຕິບ ເປັນໂຮກຕິດຕໍ່ ແລະ ອາດເປັນອັນຕະຣາຍແກ່ຊີວິດ ທີ່ເກີດມາຈາກ ການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣີຍທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫາຍໃຈຍາກທີ່ສຸດ ຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວ ແລະ ທໍາລາຍເສັ້ນປະສາດ.

ໂຮກບາດທະຍັກ ເປັນໂຮກທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ເປັນໂຮກທີ່ເຖິງແກ່ຊີວິດຂອງຮູບປະສາດ. ຄົນທີ່ເປັນໂຮກນີ້ຈະມີຄວາມເຈັບປວດຢ່າງສາຫັດຈາກກ້າມເນື້ອທີ່ຫົດ ປື້ນ ການຊັກ ແລະ ຄາງກະໄຕແຂງ. ອາການແຊກຊ້ອນປະກອບມີພະຍາດປອດ ບວມ, ກະດູກຫັກ (ຈາກການກະຕຸກຂອງກ້າມເນື້ອ), ລະບົບຫາຍໃຈລົ້ມເຫຼວ ແລະ ຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນ.

ໂຮກໄອໄກ່ (ໄອຫອບ) ເປັນໂຮກຕິດຕໍ່ອັນຮ້າຍແຮງດ້ວຍເຊື້ອແບັກທີເຣີຍທີ່ກໍ່ ໃຫ້ເກີດການໄອເປັນລະຍະ. ບັນດາພວກ ວັຍຮຸ່ນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ອາດຈະມີອາການ ໄອທີ່ໜ້າລໍາຄານດົນເຖິງສາມເດືອນ. ລະຍະທີ່ໄອແບບຮ້າຍແຮງສາມາດເຮັດໃຫ້ ຮາກ ກະດູກຂ້າງທ່ານ ເສັ້ນເລືອດຝ່ອຍແຕກ ແລະ ໃສ່ເລື່ອນ. ອາການແຊກຊ້ອນ ໃນເດັກນ້ອຍປະກອບມີ ໂຮກປອດບວມ, ຊັກ ແລະ ສະໝອງເສື່ອມ (ພາວະ ສະໝອງທໍາງານຜິດປົກກະຕິຍ້ອນຂາດອັກຊີເຈັນ).

ຖ. ໂຮກ ຄໍຕິບ ໂຮກບາດທະຍັກ ແລະ ໂຮກໄອໄກ່ ແມ່ນຜ່າຍໄດ້ ຢ່າງໃດ?

ໂຮກຄໍຕິບ ເຊື້ອແບັກທີເຣີຍສາມາດຢູ່ໃນປາກ ດັງ ລໍາຄໍ ຫຼື ຜິວໜັງຂອງຄົນທີ່ຕິດ ໂຮກນີ້. ຄົນທົ່ວໄປສາມາດຕິດໂຮກຄໍຕິບໄດ້ໂດຍການຫາຍໃຈເອົາເຊື້ອແບັກທີເຣີຍ ຈາກການໄອຫຼືຈາກຂອງຄົນທີ່ເປັນໂຮກນີ້ ເຂົ້າໄປ. ຄົນທົ່ວໄປຍັງສາມາດຕິດໂຮກ ຄໍຕິບນີ້ໄດ້ຈາກການຢູ່ໃກ້ຊິດກັບສິ່ງທີ່ຄົນເປັນໂຮກນີ້ໄດ້ປ່ອຍອອກມາຈາກປາກ ດັງ ລໍາຄໍ ຫຼື ຜິວໜັງ.

ໂຮກບາດທະຍັກ ເກີດມາຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣີຍທີ່ມາຈາກດິນ ແລະ ການຕິດໂຮກ ນີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ມີບາດແຜ ໃຫຍ່ ຫຼື ບາດແຜເລັກນ້ອຍ (ບາງຄັ້ງ ອາດຈະແມ່ນຮອຍແຫງທີ່ບໍ່ໄດ້ສັງເກດຢູ່ຜິວໜັງທີ່ຕິດເຊື້ອໂຮກຈາກດິນ ຝຸ່ນ ຫຼື ຈາກມູນສັດ).

ໂຮກໄອໄກ່ ແມ່ນຜ່າຍໄປຫາຄົນອື່ນໂດຍທາງ ຝ່ອຍນໍ້າຈາກການໄອ ຫຼື ຈາມ. ຄົນທີ່ເປັນໂຮກໄອໄກ່ນີ້ ຖ້າບໍ່ຮັກສາ ຄົນທີ່ເປັນໂຮກໄອໄກ່ກໍສາມາດແມ່ນຜ່າຍໄປ ຫາຄົນອື່ນໄດ້ຫຼັງຈາກເລີ່ມຕົ້ນໄອໄປຈົນເຖິງ 3 ອາທິດ.

ຖ. ຢາວັກຊີນທໍາງານຢ່າງໃດ?

ຢາວັກຊີນທໍາງານໂດຍການໄປກະຕຸ້ນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດ ເຊື້ອໂຮກບາງຢ່າງ. ຖ້າວ່າຄົນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກແລ້ວມີການສໍາຜັດ ກັບການຕິດ ເຊື້ອໂຮກເຫຼົ່ານີ້ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງພວກ ເຂົາກໍຈະສາມາດຕອບ ຮັບໄດ້ໂດຍມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງການປ້ອງກັນການຂະ ຫຍາຍຕົວ ຂອງເຊື້ອໂຮກ ຫຼື ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງມັນໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ຖ. ຢາວັກຊີນມີປະສິດທິຜົນເທົ່າໃດ?

ຢາວັກຊີນມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນໂຮກຄໍຕິບ ແລະ ບາດທະຍັກ ແລະ ປະມານ 80% ໃນການປ້ອງກັນໂຮກໄອໄກ່.

ຖ. ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ລູກຂ້ອຍຕ້ອງສັກຢາຈັກເຂັມ?

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ວັຍຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ dTpa ເຂັມນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ການ ປ້ອງກັນ ໂຮກຄໍຕິບ, ໂຮກບາດທະຍັກ ແລະ ໂຮກໄອໄກ່.

ຖ. ແມ່ນໃຜທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢານີ້?

ຄົນວັຍໜຸ່ມທຸກຄົນຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢາຊຸດກະຕຸ້ນຂອງ dTpa ເພື່ອ ໃຫ້ມີການປ້ອງກັນໂຮກຄໍຕິບ ໂຮກບາດທະຍັກ ແລະ ໂຮກໄອໄກ່. ຢາຊຸດ ກະຕຸ້ນນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການ ຊ່ວຍຮັກສາພູມຕ້ານທານເມື່ອກ້າວເຂົ້າ ສູ່ວັຍຜູ້ໃຫຍ່ຫຼັງຈາກໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນປ້ອງກັນ ໂຮກຄໍຕິບ-ໂຮກບາດທະ ຍັກ ແລະ ໂຮກໄອໄກ່ ຄັ້ງກ່ອນໃນວັຍເດັກ. ບັນດານັກຮຽນທີ່ເຄີຍໄດ້ສັກຢາ ປ້ອງກັນໂຮກຄໍຕິບ-ບາດທະຍັກ (ADT) ມາແລ້ວກໍສາມາດໄດ້ຮັບການສັກຢາ dTpa ໄດ້ອີກເພື່ອປ້ອງກັນໂຮກໄອໄກ່.

ຖ. ແມ່ນໃຜທີ່ບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢານີ້?

- ຢາປ້ອງກັນໂຮກ dTpa ນີ້ບໍ່ຄວນສັກໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່:
- ເຄີຍມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຫຼັງຈາກການສັກຢາຄັ້ງກ່ອນ
 - ເຄີຍມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຕໍ່ສ່ວນປະສົມໃດນຶ່ງຂອງຢາສັກ (ຈັດເປັນບັນຊີ ລາຍການໄວ້ຢູ່ໜ້າຕໍ່ໄປ)

ຖ. ຖ້າຂ້ອຍຈະລໍຖ້າຈົນລູກຂ້ອຍອາຍຸສູງຂຶ້ນຈະເປັນຢ່າງໃດ?

ຢາວັກຊີນ dTpa ສາມາດສະໜອງໃຫ້ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນເທົ່ານັ້ນໂດຍໃຫ້ທ່ານສົ່ງແບບຟອມຍິນຍອມ ທີ່ເຊັນໃນຂະນະທີ່ລູກທ່ານຢູ່ໃນສູນຮຽນພາສາອັງກິດທີ່ເຂັມຊັ້ນ ຫຼືໃນ Year 7. ຖ້າທ່ານເລືອກທີ່ຈະລໍຖ້າ ຈົນກວ່າລູກທ່ານໃຫຍ່ກວ່ານີ້ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດນັດໝາຍສັກຢາກັບນາຍໝໍຂອງທ່ານ.

ຖ. ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກປອດໄພເທົ່າໃດ?

ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍນີ້ແມ່ນປອດໄພຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານການກວດກາຢ່າງເຄັ່ງຄັດໂດຍ ອົງການຄວບຄຸມຢາເພື່ອການບໍາບັດ (TGA) ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ອົງການ (TGA) ຍັງໄດ້ຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພຂອງຢາສັກໃນເວລາທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ອີກດ້ວຍ.

ຖ. ຢາສັກກັນໂຮກນີ້ບັນຈຸຫຍັງແດ່?

ຢາສັກນີ້ ບັນຈຸ aluminium hydroxide ແລະ phosphate, formaldehyde ໜ້ອຍນຶ່ງ, polysorbate 80 ແລະ glycine ໄດ້ ສໍາຜັດກັບວັດສະດຸທີ່ອອກມາຈາກ bovine ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ.

ຖ. ອາການຂ້າງຄຽງຂອງການສັກຢາກັນໂຮກ ມີຫຍັງແດ່?

ອາການຂ້າງຄຽງ ມີພຽງເບົາບາງ ແລະ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນຮອຍແດງ ມີອາການເຈັບ ແລະ ໃຄ່ຕາມບໍຣິເວນສັກຢາ ຫຼື ເປັນໄຂ້. ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ຮ້າຍແຮງນັ້ນມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອາການຂ້າງຄຽງແມ່ນມີໄວ້ໃຫ້ທີ່ ກອງຂໍ້ມູນເລື່ອງຢາ ສໍາລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ [Consumer Medicine Information (CMI)] ສໍາລັບຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກແມ່ນມີໄວ້ທີ່ www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination. ບັນດາພໍ່ແມ່ທີ່ເປັນກຸ່ມວັກຊີນກ່ຽວກັບອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆຫຼັງຈາກການສັກຢານັ້ນ ຄວນຕິດຕໍ່ນາຍໝໍຂອງພວກເຂົາຜູ້ຊຶ່ງຈະເປັນຜູ້ລາຍງານໄປຫາພະແນກສຸຂະພາບ ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ.

ຖ. Anaphylaxis (ອາການແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ) ແມ່ນຫຍັງ?

Anaphylaxis ແມ່ນອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສລົບ ແລະ ຕາຍໄດ້ຖ້າບໍ່ປິ່ນປົວໃຫ້ໄວ. ມັນຈະເກີດໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ ຫຼັງຈາກການສັກຢາ. ພວກພະຍາບານທີ່ເຮັດວຽກດ້ານ ການສ້າງພູມຕ້ານທານໂຮກຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນກໍໄດ້ຮັບການຝຶກຫັດມາແລ້ວເປັນຢ່າງດີໃນການປິ່ນປົວອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງນີ້.

ຖ. ຖ້າລູກຂ້ອຍເຄີຍມີປະຕິກິຣິຍາຮຸນແຮງຕໍ່ຢາສັກ Triple Antigen ຫຼື DTP ອັນເກົ່າຕັ້ງແຕ່ຍັງເປັນເດັກທາຣົກຢູ່ເດ?

ນອກຈາກວ່າລູກຂອງທ່ານຈະມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງ ຫຼື ປະຕິກິຣິຍາແພ້ໃນທັນທີຕໍ່ຢາສັກອັນເກົ່າ ມັນກໍຈະເປັນການປອດໄພສໍາລັບລູກຂອງທ່ານໃນການຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ dTpa.

ຖ. ຖ້າລູກຂ້ອຍເປັນໂຮກຫິດ ແລະ ກິນຢາ ກອກຕີໂຊນ ຫຼື ເປຣັດນີໂຊນ ດ້ວຍການໃຊ້ “ອັນເປົ່າ” ເດ?

ຢາສັກ ປ້ອງກັນໂຮກ dTpa ສາມາດສັກໃຫ້ໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ເປັນໂຮກຫິດໄດ້ໂດຍປອດໄພ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະພວກກິນຢາຫຍັງຢູ່.

ຖ. ແມ່ນໃຜສາມາດຍິນຍອມຕໍ່ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ແລະ ຈະສາມາດຖອນການຍິນຍອມໄດ້ບໍ່?

ມີແຕ່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຍິນຍອມຕໍ່ການສັກ ຢາປ້ອງກັນໂຮກສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່ກວ່າ 18ປີ. ນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸ 18ປີແລະຫຼາຍກວ່າອາດຈະຍິນຍອມຕໍ່ການ ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄວນຂຽນຕື່ມພ້ອມທັງເຊັນຟອມຍິນຍອມບ່ອນທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ‘ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ’. ການຍິນຍອມສາມາດຖືກຖອນຄືນໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍການແຈ້ງໄປຫາທາງ

ໂຮງຮຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເລື່ອງການຖອນການຍິນຍອມ ຫຼື ໂທຣະສັບຫາໂຮງຮຽນເພື່ອຖອນການຍິນຍອມນັ້ນ.

ຖ. ຄວນສັກຢາກັນໂຮກນີ້ແກ່ນັກຮຽນຍິງທີ່ຖືພາຫຼື ຄິດວ່າລາວອາດຈະຖືພາ ບໍ່?

ບໍ່. ນັກຮຽນຍິງຜູ້ໃດທີ່ຖືພາ ຫຼື ຄິດວ່າລາວອາດຈະຖືພາບໍ່ຄວນສັກຢາກັນໂຮກນີ້. ໃນວັນທີ່ເປີດຄລິນິກ ພະຍາບານສັກຢາຈະຖາມບັນດານັກຮຽນຜູ້ຍິງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຖືພາ ຫຼື ຄິດວ່າອາດຈະຖືພາຫຼືບໍ່. ຖ້າຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນຕໍ່ຄໍາຖາມນີ້ວ່າ ແມ່ນ ລາວກໍຈະບໍ່ໄດ້ສັກຢາ. ນັກຮຽນກໍຈະຖືກແນະນໍາໃຫ້ປຶກສາຫາລື ບັນຫານີ້ກັບພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງຂອງລາວ ແລະ ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການແພດໃນທັນທີ. ນອກຈາກນີ້ລາວຍັງຈະໄດ້ຮັບຮາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ຂອງບໍຣິການການສົ່ງຕໍ່ດ້ານສຸຂະພາບຊຶ່ງຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ການອຸ້ມຊູ ແລະ ການຊີ້ນໍາ.

ຖ. ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດຖ້າລູກຂ້ອຍພາດຈາກການສັກຢາທີ່ໂຮງຮຽນຍ້ອນເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ຂາດໂຮງຮຽນໃນມື້ທີ່ພະຍາບານມາ?

ທ່ານຄວນຕິດຕໍ່ນາຍໝໍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໄດ້ສັກຢາ.

ຖ. ຂ້ອຍຈະເຂົ້າເຖິງບັນທຶກການສັກຢາໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນຂອງລູກທ່ານຈະຖືກອັບໂຫຼດໃສ່ທະບຽນສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ (AIR) ເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະຫວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງລູກທ່ານ.

ບັນດາພໍ່ແມ່ສາມາດຂໍສໍາເນົາໃບລາຍງານປະຫວັດການສັກຢາ AIR ຂອງລູກພວກເຂົາໄດ້ທຸກເວລາ ຈົນຮອດລູກພວກເຂົາອາຍຸ 14 ປີຂຶ້ນໄປ, ແລະ ນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸ 14 ປີຂຶ້ນໄປສາມາດຂໍໃບປະກາດປະຫວັດການສັກຢາດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ນໍາໃຊ້ບັນຊີ Medicare online ຜ່ານ myGov [my.gov.au/](http://my.gov.au)
- ນໍາໃຊ້ແອັບ Medicare Express Plus www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
- ໂທຫາສາຍສອບຖາມທົ່ວໄປ AIR ທີ່ເບີ 1800 653 809.

ຖ. ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຂໍ້ມູນຂອງລູກຂ້ອຍ?

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານເອົາໃຫ້ຢູ່ຟອມຍິນຍອມການສັກຢາກັນໂຮກ ນັ້ນຈະມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ຖືເປັນຄວາມລັບ ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດທີ່ມີຢູ່ໃນກົດໝາຍຂອງຣັດ NSW ແລະ ຣັຖບານກາງ (ເບິ່ງຢູ່ໃນຄໍາຖາມແລງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ຄັດຕິດມາ). ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຖືກເອົາເຂົ້າໃສ່ໄວ້ຢູ່ໃນກອງທະບຽນການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ຂອງກົມອານາໄມ ຣັດ NSW ແລະ ແລ້ວກໍຈະຖືກອັບໂຫຼດເຂົ້າໄປຫາ ກອງລົງທະບຽນ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກແຫ່ງ ອອສເຕຣເລຍ (AIR) ເພື່ອວ່າຈະສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໄປຫາປະຫວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຂອງລູກທ່ານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ MyGov.

ຖ. ຂ້ອຍຈະຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໄດ້ຈາກໃສ?

- ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມມີໄວ້ໃຫ້:
- ໂດຍການເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຕ໌ຂອງກົມອະນາໄມແຫ່ງຣັດ ນຊວ ທີ່: www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
- ໂດຍການຕິດຕໍ່ ພະແນກ ອະນາໄມຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ທີ່ເບີ 1300 066 055

ໃບຍິນຍອມສໍາລັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຄໍຕິບ ໂຮກບາດທະຍັກ ແລະ ໂຮກໄອໄກ້ (dTpa)

ໃຫ້ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ ກະຮຸນາຂຽນເປັນຕົວພິມໂດຍໃຊ້ປາກກາສິດໍາ ຫຼື ສີຟ້າ.

1. ຮາຍລະອຽດຂອງນັກຮຽນ

ນາມສະກຸນ

ສາຍ

ວັນ ເດືອນ ປີເກີດ

 / / 2 0

ແພດ

 ຜູ້ຊາຍ ແມ່ຍິງ

ບໍ່ກຳນົດ/ລະຫວ່າງສອງ
ແພດ/ບໍ່ລະບຸ

ຊື່ນຮຽນ

ຊື່ຂອງໂຮງຮຽນ

ນໍາເບີຂອງ ເມດີແຄຣ໌

ໝາຍເລກທີ່ຢູ່ໃກ້ຊື່ຂອງລູກທ່ານຢູ່
ໃນບັດ ເມດີແຄຣ໌

2. ສະຖານະພາບໃນການມີເຊື້ອຊາດເປັນຄົນພື້ນເມືອງ

ບໍ່ແມ່ນ

ແມ່ນ, ເປັນຊາວ
ອາບໍຣິຈິໂນລ

ແມ່ນ, ເປັນຊາວ ທໍເຣສເຕຣດ
ໄອແລນເດີ

ແມ່ນ, ເປັນທັງຊາວ ອາບໍຣິຈິໂນລ
ແລະ ທໍເຣສເຕຣດ ໄອແລນເດີ

3. ຮາຍລະອຽດຂອງທ່ານ - ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງ

ຂ້ອຍໄດ້ອ່ານແລະໄດ້ເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເອົາໃຫ້ກ່ຽວກັບ ຜົນປະໂຫຍດ
ແລະ ບັນດາອາການຂ້າງຄຽງທີ່ອາດຈະມີຂອງການສັກຢາປ້ອງກັນ
ໂຮກຄໍຕິບ ໂຮກບາດທະຍັກ ແລະ ໂຮກໄອໄກ້ (dTpa).

ຂ້ອຍໃຫ້ການຍິນຍອມມານະທີ່ນີ້ສໍາລັບລູກຂ້ອຍທີ່ມີ ຊື່ຢູ່ຂ້າງເທິງ
ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນ ໂຮກຄໍຕິບ ໂຮກບາດທະຍັກ
ແລະ ໂຮກໄອໄກ້ (dTpa) ຄັ້ງນີ້.

ຂ້ອຍປະຕິຍານ ຕາມທີ່ຂ້ອຍຮູ້ດີທີ່ສຸດ ວ່າ ລູກຂອງຂ້ອຍ:

- ບໍ່ເຄີຍມີອາການພູມແພ້ຢ່າງແຮງຫຼັງຈາກການສັກ ຢາປ້ອງກັນ
ໂຮກໃດໆ.
- ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວ້ຕໍ່ອາການແພ້ອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ສ່ວນປະສົມຂອງ
ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີ ຂອງປື້ມຂໍ້ມູນ ສໍາລັບພໍ່ແມ່ທີ່
ຄັດຕິດມານີ້.
- ປັດຈຸບັນບໍ່ໄດ້ຖືພາ.

ຊື່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ (ຕົວຢ່າງ: JOHN SMITH)

ທີ່ຢູ່ (ຕົວຢ່າງ: 5 SMITH LANE)

ຄຸ້ມ

ຮະຫດໄປສະນີ

ນໍາເບີໂທຣະສັບມືຖື

ເລກໂທຣະສັບຕິດຕໍ່ທີ່ຕີອີກເລກນຶ່ງ (ຮວມທັງຮະຫັດເຂດ ຕົວຢ່າງ: 02)

ລາຍເຊັນຂອງພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ

ວັນທີ

 / / 2 0

ໃຫ້ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ

ຊື່ຂອງນັກຮຽນ (ຕົວຢ່າງ: JANE SMITH)

ສໍາລັບທ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ

ແຂນ ຊ້າຍ ເວລາຂອງການສັກຢາ (24ຊົ່ວໂມງ) ໝາຍເລກຂອງຢາສັກ

ຂວາ

ລາຍເຊັນຂອງພະຍາບານ

ວັນທີ

2 0

x

ຄວາມເຫັນຂອງພະຍາບານ

ເຫັນຜົນທີ່ບໍ່ສັກຢາ

- ຂາດໂຮງຮຽນ
- ປະຕິເສດ
- ບໍ່ສະບາຍ
- ບໍ່ມີລາຍເຊັນ
- ຖອນການຍິນຍອມ
- ອື່ນໆ

ໃຫ້ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ

ຊື່ຂອງນັກຮຽນ (ຕົວຢ່າງ: JANE SMITH)

ສໍາລັບທ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ

ແຂນ ຊ້າຍ ເວລາຂອງການສັກຢາ (24ຊົ່ວໂມງ) ໝາຍເລກຂອງຢາສັກ

ຂວາ

ລາຍເຊັນຂອງພະຍາບານ

ວັນທີ

2 0

x

ຕ້ອງເຮັດຫຍັງແຕ່ຫຼັງຈາກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ

ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າປະຕິກິລິຍາເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິເວນບ່ອນສັກຢາ

- ເກັບບັນທຶກນີ້ໄວ້ ເພື່ອວ່າທ່ານອາດຈະຕ້ອງຖືກຂໍ ໃຫ້ເອົາຂໍ້ມູນນີ້ໃຫ້ໃນພາຍຫຼັງ.
- ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນຂອງລູກທ່ານຈະຖືກອັບໂຫຼດອັດຕະໂນມັດໄປໃສ່ການລົງທະບຽນສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກອອສເຕຣເລຍ (Australian Immunisation Register (AIR)). ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການອັບເດດກັບນາຍໝໍ ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວັນທີຂອງການສັກຢາ.

- ເອົາຜ້າຈຸ່ມນໍ້າເຢັນໝາດໆໃສ່ຢູ່ເທິງບ່ອນສັກຢາ ເພື່ອບັນເທົາອາການເຈັບປວດ.
- ກິນຢາ ພາຣາເຊຕາມອນ ຖ້າເຈັບປວດ.
- ຕື່ມນໍ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຖ້າລູກທ່ານເກີດມີປະຕິກິລິຍາທີ່ທ່ານເປັນກົງວັນ ກະຊນາຕິດຕໍ່ນາຍໝໍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ





ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກ ວາຣິແຊລລາ (ໂຮກໝາກໃສ)

Varicella (chickenpox) vaccine

ກົມ ອະນາໄມ ແຫ່ງຣັດ ນຊວ ສະເໜີການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ທີ່ ສະພາການຄົ້ນຄວ້າດ້ານສຸຂະພາບແລະການແພດແຫ່ງຊາດໄດ້ ແນະນຳສໍາລັບໂຄງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກສໍາລັບພວກວັຍໜຸ່ມ ໃນໂຮງຮຽນ. ຕ້ອງມີໜັງສືຍິນຍອມທີ່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງເຊັນຮັບ.

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ

- ອ່ານເຈ້ຍຂໍ້ມູນ ນີ້ໃຫ້ດີ.
- ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ລູກທ່ານໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກໝາກໃສ ຈົ່ງຂຽນຕື່ມ ຟອມຍິນຍອມແລ້ວເອົາຟອມຍິນຍອມທີ່ທ່ານເຊັນຮັບ ແລ້ວໃຫ້ລູກທ່ານນຳກັບໄປໃຫ້ ໂຮງຮຽນ.
- ຖ້າທ່ານ ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ລູກທ່ານສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກໝາກໃສ ຢ່າ ຂຽນຕື່ມຟອມ ຍິນຍອມນັ້ນ ຫຼື ສົ່ງຟອມກັບໄປໃຫ້ໂຮງຮຽນ.

ຖ. ໂຮກໝາກໃສ ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຮກໝາກໃສເປັນໂຮກຕິດຕໍ່ງ່າຍທີ່ສຸດຊຶ່ງເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ວາຣິແຊລລາ ຊິສເຕີຣ໌. ຕາມປົກກະຕິ ແລ້ວ ໂຮກນີ້ຈະເປັນໂຮກທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງປານໃດ ແລະ ເປັນລະຍະສັ້ນໃນເດັກທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ມີອາການເຊັນ ເປັນໄຂ້ຕົວຮ້ອນ ເລັກນ້ອຍ ຂໍ້ມູກໄຫຼ ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍຕົວທົ່ວໄປ ແລະ ມີຕຸ່ມຜົນຄັນ ແລ້ວເກີດ ເປັນຕຸ່ມໃສ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ໂຮກນີ້ຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ສາມາດ ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນໂຮກຮ້າຍ ແຮງທີ່ເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີພູມຕ້ານທານຕໍ່າ. ນຶ່ງໃນ 4,000 ກໍລະນີຈະປະສົບກັບອາການສູນເສຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງກ້າມ ເນື້ອຢ່າງຫັນທີ (acute cerebellar ataxia) ໃນຂະນະທີ່ ນຶ່ງໃນ 100,000 ຄົນ ຈະເປັນ ໂຮກ ສະໝອງອັກເສບ. ການເປັນໂຮກນີ້ໃນຂະນະທີ່ຖືພາອາດເຮັດ ໃຫ້ ເດັກທີ່ເກີດມາມີພາວະຜິດ ປົກກະຕິໄດ້ ຮວມເຖິງເປັນແປ້ວຕາມຜິວໜັງ ແລະ ແຂນຂາບໍ່ສົມປະກອບ.

ຖ. ໂຮກໝາກໃສແພ່ຜາຍໄດ້ຢ່າງໃດ?

ໃນຕອນຕົ້ນຂອງການປ່ວຍ ເຊື້ອໄວຣັສຈະແພ່ຜາຍໂດຍການໄອ. ໃນຕອນຫຼັງ ຂອງການປ່ວຍ ເຊື້ອໄວຣັສ ແພ່ຜາຍໂດຍການສໍາຜັດໂດຍກົງກັບນໍ້າທີ່ອອກ ຈາກຕຸ່ມແຕກ. ການຕິດເຊື້ອໂຮກນີ້ເປັນການຕິດແປດທີ່ໄວທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ທີ່ ບໍ່ເຄີຍເປັນໂຮກໝາກໃສມາກ່ອນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນເຄີຍສັກຢາປ້ອງກັນ. ຜູ້ທີ່ເປັນ ໂຮກນີ້ຈະເລີ້ມ ຕິດໂຮກນັບຈາກນຶ່ງ ຫຼື ສອງວັນກ່ອນທີ່ຕຸ່ມຈະປະກົດໃຫ້ເຫັນ (ນັ້ນຄືໃນລະຍະທີ່ຂໍ້ມູກໄຫຼ) ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນເຖິງຫ້າວັນ (ເມື່ອເວລາທີ່ຕຸ່ມໃສ ແຕກແລະກາຍເປັນຕົກເກັດ).

ຖ. ຢາວັກຊີນທໍາການຢ່າງໃດ?

ຢາວັກຊີນທໍາການໂດຍການໄປກະຕຸ້ນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດ ເຊື້ອໂຮກບາງຢ່າງ. ຖ້າວ່າຄົນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກແລ້ວມີການສໍາຜັດ ກັບການຕິດ ເຊື້ອໂຮກເຫຼົ່ານີ້ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງພວກ ເຂົາກໍຈະສາມາດ ຕອບຮັບໄດ້ໂດຍມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງການປ້ອງກັນການຂະ ຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອໂຮກ ຫຼື ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງມັນໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ຖ. ຢາວັກຊີນມີປະສິດທິຜົນເທົ່າໃດ?

ຢາສັກກັນໂຮກໝາກໃສເຂັ້ມດຽວມີປະສິດທິພາບ 80-85%ໃນການປ້ອງກັນ ໂຮກໝາກໃສ ແລະ ມີປະສິດທິ ພາບສູງໃນການປ້ອງກັນໂຮກທີ່ຮ້າຍແຮງອື່ນໆ.

ຖ. ແມ່ນໃຜທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢານີ້?

ບັນດານັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸເຖິງ 14ປີຕ້ອງສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ໝາກໃສນຶ່ງເຂັ້ມ, ນອກຈາກວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຄີຍສັກຢາ ມາແລ້ວ (ຕາມທີ່ມະນະດາແມ່ນຕອນອາຍຸ 18ເດືອນ) ຫຼື ເຄີຍເປັນໂຮກໝາກໃສມາແລ້ວ. ບັນດານັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸ 14ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າຕ້ອງສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກໝາກໃສ ສອງເຂັ້ມໃນລະຍະຫ່າງກັນ 1-2ເດືອນເປັນຢ່າງຕໍ່າໂດຍ ນາຍໝໍຂອງພວກເຂົາ.

ຖ. ແມ່ນໃຜທີ່ບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢານີ້?

ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກໝາກໃສນີ້ ບໍ່ຄວນ ສັກໃຫ້ຜູ້ທີ່:

- ເຄີຍມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຫຼັງຈາກການສັກຢາຄັ້ງກ່ອນ
- ເຄີຍມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຕໍ່ສ່ວນປະສົມໃດນຶ່ງຂອງຢາສັກ (ຈັດເປັນບັນຊີລາຍການໄວ້ຢູ່ຫ້າຕໍ່ໄປ)
- ຖືພາ (ຄວນຫຼີກເວັ້ນການຖືພາ 28 ວັນຫຼັງຈາກການສັກຢາ)
- ເຄີຍໄດ້ຮັບການປ່ຽນເລືອດ/ສັກຢາເພື່ອສ້າງພູມຕ້ານທານ ພາຍໃນລະຍະ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
- ເຄີຍໄດ້ຮັບການສັກຢາດ້ວຍເຊື້ອທີ່ມີຊີວິດພາຍໃນ 4 ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ (ເຊັ່ນ MMR (ໂຮກຫັດ ໂຮກໝາກເບີດ ແລະ ໂຮກ ໝາກໃສ) BCG (ວັນນະໂຮກ) ແລະ ໂຮກ ໝາກເຫຼືອງ).
- ຂາດພູມຕ້ານທານ ເຊັ່ນ:
 - i. ບຸກຄົນທີ່ມີໂຮກ ເຮັສໄອວີ/ເອດສ໌
 - ii. ບຸກຄົນທີ່ພວມຮັບການຮັກສາດ້ວຍຣະບົບທີ່ເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານຕໍ່າ, ການບໍາບັດແບບໃຊ້ເຄມີ, ການບໍາບັດດ້ວຍແສງຮັງສີ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກິນຢາ ສ້າງຄວາມສົມດຸນໃຫ້ຮ່າງກາຍ (corticosteroids)
 - iii. ບຸກຄົນທີ່ປ່ວຍຢ່າງຮ້າຍແຮງເນື່ອງຈາກຣະບົບພູມຕ້ານທານພະຍາດຕໍ່າ ຮວມເຖິງພາວະຄວາມບົກພ່ອງຂອງການຈະເຣີນເຕີບໂຕຂອງເນື້ອເຍື່ອນໍ້າ ເຫຼືອງ, ມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວ ຫຼື ພາວະ ຮ້າຍແຮງຢ່າງອື່ນທີ່ອາດເຖິງຂັ້ນ ເສຍຊີວິດໄດ້.

ຖ. Anaphylaxis (ອາການແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ) ແມ່ນຫຍັງ?

Anaphylaxis ແມ່ນອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສລົບ ແລະ ຕາຍ ໄດ້ຖ້າບໍ່ປິ່ນປົວໃຫ້ໄວ. ມັນຈະເກີດໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ ຫຼັງຈາກການສັກຢາ. ພວກ ພະຍາບານທີ່ເຮັດວຽກດ້ານ ການສ້າງພູມຕ້ານທານໂຮກຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນກໍໄດ້ ຮັບການຝຶກຫັດມາແລ້ວເປັນຢ່າງດີໃນການປິ່ນປົວອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງນີ້.

ຖ. ຂ້ອຍຄວນເຮັດຢ່າງໃດ ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ມີບັນທຶກ ຫຼື ຂ້ອຍບໍ່ຈື່ວ່າລູກຂອງຂ້ອຍເຄີຍເປັນໂຣກໝາກໃສ ຫຼືເຄີຍໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໝາກໃສ ຫຼືຍັງ?

ບັນດາເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນໂຣກໝາກໃສ ອີກຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ຢ່າງປອດໄພຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າເຄີຍເປັນໂຣກໝາກໃສ ມາກ່ອນຫຼືບໍ່ ຫຼື ຖ້າຫາກບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າເຄີຍສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໝາກໃສ ມາກ່ອນ.

ຖ. ຢາສັກກັນໂຣກໝາກໃສ ບັນຈຸທາດເສີມຫຍັງແດ່?

ຢາສັກນີ້ ບັນຈຸ ຊູໂກຣສ ຮາຍໂດຣລີເຊດ ບິຊິນ ເຈລາຕິນ ຢູເຣອາ ໂມໂນໂຊດຽມ ກລູຕາເມດ ສ່ວນເສດ ເຫຼືອຂອງອົງປະກອບຂອງເຊລ MRC-5, ຮ່ອງຮອຍຂອງເຊໂຣມ ນີໂອມິຊິນ ແລະ ໂບວິນ). ທາດເສີມໄດ້ຖືກນຳມາປະສົມ ເປັນຈຳນວນເລັກນ້ອຍ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຢາກັນໂຣກທຳການ ຫຼື ທຳໜ້າທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຢາເສີຍ. ຢາວັກຊີນນີ້ໄດ້ ສຳ ຜັດກັບວັດສະດຸທີ່ອອກມາຈາກ bovine (ສັດໃຫຍ່ເຊັ່ນງົວ) ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ.

ຖ. ຢາສັກປ້ອງກັນໂຣກປອດໄພເທົ່າໃດ?

ຢາສັກປ້ອງກັນໂຣກຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍນີ້ແມ່ນປອດໄພຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານການກວດກາຢ່າງເຄັ່ງຄັດໂດຍ ອົງການຄວບຄຸມຢາເພື່ອການນຳບັດ (TGA) ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ອົງການ (TGA) ຍັງໄດ້ຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພຂອງຢາສັກໃນເວລາທີ່ຖືກນຳໃຊ້ອີກດ້ວຍ.

ຖ. ອາການຂ້າງຄຽງຂອງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໝາກໃສມີຫຍັງແດ່?

ອາການຂ້າງຄຽງ ມີພຽງເບົາບາງ ແລະ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນຮອຍແດງ ມີອາການເຈັບ ແລະ ໃຄ່ຕາມບໍຣິເວນສັກຢາ ຫຼື ເປັນໄຂ້. ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ຮ້າຍແຮງນັ້ນມີນ້ອຍທີ່ສຸດ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອາການຂ້າງຄຽງແມ່ນມີໄວ້ໃຫ້ທີ່ ກອງຂໍ້ມູນເລື່ອງຢາ ສຳລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ [Consumer Medicine Information (CMI)] ສຳລັບຢາສັກປ້ອງກັນໂຣກແມ່ນມີໄວ້ທີ່ www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination. ບັນດາພໍ່ແມ່ທີ່ເປັນກົງວັນກ່ຽວກັບອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆຫຼັງຈາກການສັກຢານັ້ນ ຄວນຕິດຕໍ່ນາຍໝໍຂອງພວກເຂົາຜູ້ຊຶ່ງຈະເປັນຜູ້ລາຍງານໄປຫາພະແນກສຸຂພາບ ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ.

ຖ. ຄວນສັກຢາກັນໂຣກນີ້ແກ່ນັກຮຽນຍິງທີ່ຖືພາຫຼືຄິດວ່າລາວອາດຈະຖືພາ ບໍ່?

ບໍ່. ນັກຮຽນຍິງຜູ້ໃດທີ່ຖືພາ ຫຼື ຄິດວ່າລາວອາດຈະຖືພາບໍ່ຄວນສັກຢາກັນໂຣກນີ້. ໃນວັນທີ່ເປີດຄລິນິກ ພະຍາບານສັກຢາຈະຖາມບັນດານັກຮຽນຜູ້ຍິງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຖືພາ ຫຼື ຄິດວ່າອາດຈະຖືພາຫຼືບໍ່. ຖ້າຄຳຕອບຂອງນັກຮຽນຕໍ່ຄຳຖາມນີ້ວ່າ ແມ່ນ ລາວກໍຈະບໍ່ໄດ້ສັກຢາ. ນັກຮຽນກໍຈະຖືກແນະນຳໃຫ້ປຶກສາຫາລືບັນຫານີ້ກັບພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງຂອງລາວ ແລະ ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການແພດໃນທັນທີ. ນອກຈາກນີ້ລາວຍັງຈະໄດ້ຮັບຮາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ຂອງບໍຣິການການສັ່ງຕໍ່ດ້ານສຸຂພາບຊຶ່ງຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳ ການອູ້ມູ ແລະ ການຊີ້ນຳ.

ບັນດານັກຮຽນຍິງທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໝາກໃສ ບໍ່ຄວນຖືພາພາຍໃນ 28 ມື້ຫຼັງຈາກການສັກຢານັ້ນ.

ຖ. ຖ້າລູກຂ້ອຍເປັນໂຣກຫຼື ແລະ ກິນຢາ ກອັກຕີໂຊນ ຫຼື ເປຣັດນີໂຊນ ດ້ວຍການໃຊ້ “ອັນເປົາ” ເດ?

ຢາສັກປ້ອງກັນໂຣກໝາກໃສສາມາດສັກໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີໂຣກຫຼື ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະພວມກິນຢາຫຍັງຢູ່ກໍ ຕາມ.

ຖ. ຂ້ອຍຈະຖອນຄຳຍິນຍອມໄດ້ບໍ່?

ຄຳຍິນຍອມສາມາດຖອນໄດ້ທຸກເວລາດ້ວຍການແຈ້ງການຖອນຄຳຍິນຍອມໄປຫາທາງໂຮງຮຽນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື ໂທຮະສັບໄປຫາໂຮງຮຽນເພື່ອຖອນຄຳຍິນຍອມນີ້.

ຖ. ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດຖ້າລູກຂ້ອຍພາດຈາກການສັກຢາທີ່ໂຮງຮຽນຍ້ອນເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ຂາດໂຮງຮຽນໃນມື້ທີ່ພະຍາບານມາ?

ທ່ານຄວນຕິດຕໍ່ນາຍໝໍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໄດ້ສັກຢາ.

ຖ. ຂ້ອຍຈະເຂົ້າເຖິງບັນທຶກການສັກຢາໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນຂອງລູກທ່ານຈະຖືກອັບໂຫຼດໃສ່ທະບຽນສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ (AIR) ເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະຫວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງລູກທ່ານ.

ບັນດາພໍ່ແມ່ສາມາດຂໍສຳເນົາໃບລາຍງານປະຫວັດການສັກຢາ AIR ຂອງລູກພວກເຂົາໄດ້ທຸກເວລາ ຈົນຮອດລູກພວກເຂົາອາຍຸ 14 ປີຂຶ້ນໄປ, ແລະ ນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸ 14 ປີຂຶ້ນໄປສາມາດຂໍໃບປະກາດປະຫວັດການສັກຢາດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ນຳໃຊ້ບັນຊີ Medicare online ຜ່ານ myGov my.gov.au/
- ນຳໃຊ້ແອັບ Medicare Express Plus www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
- ໂທຫາສາຍສອບຖາມທົ່ວໄປ AIR ທີ່ເບີ 1800 653 809.

ຖ. ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຂໍ້ມູນຂອງລູກຂ້ອຍ?

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານເອົາໃຫ້ຢູ່ຟອມຍິນຍອມການສັກຢາກັນໂຣກ ນັ້ນຈະມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ຖືເປັນຄວາມລັບ ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດທີ່ມີຢູ່ໃນກົດໝາຍຂອງຣັດ NSW ແລະ ຣັຖບານກາງ (ເບິ່ງຢູ່ໃນຄຳຖາມແລງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ຄັດຕິດມາ). ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຖືກເອົາເຂົ້າໃສ່ໄວ້ຢູ່ໃນກອງທະບຽນການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ຂອງກົມອານາໄມ ຣັດ NSW ແລະ ແລ້ວກໍຈະຖືກອັບໂຫຼດເຂົ້າໄປຫາ ກອງລົງທະບຽນ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກແຫ່ງອອສເຕຣເລຍ (AIR) ເພື່ອວ່າຈະສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໄປຫາປະຫວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຂອງລູກທ່ານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ MyGov.

ຖ. ຂ້ອຍຈະຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໄດ້ຈາກໃສ?

- ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມມີໄວ້ໃຫ້:
- ໂດຍການເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຕ໌ຂອງກົມອະນາໄມແຫ່ງຣັດ ນຊວ ທີ່: www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
 - ໂດຍການຕິດຕໍ່ ພະແນກ ອະນາໄມຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ທີ່ເບີ 1300 066 055

ໃບຍິນຍອມສໍາລັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ Varicella (ໂຮກໝາກສຸກ)

ໃຫ້ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ ກະຮຸນາຂຽນເປັນຕົວພິມໂດຍໃຊ້ປາກກາສິດໍາ ຫຼື ສີຟ້າ.

1. ຮາຍລະອຽດຂອງນັກຮຽນ

ນາມສະກຸນ

ຊື່

ວັນ ເດືອນ ປີເກີດ

 / / 2 0

ເພດ

 ຜູ້ຊາຍ ແມ່ຍິງ

ບໍ່ກຳນົດ/ລະຫວ່າງສອງ
ເພດ/ບໍ່ລະບຸ

ຊັ້ນຮຽນ

ຊື່ຂອງໂຮງຮຽນ

ນໍາເນີຂອງ ເມດີແຄຣ໌

ໝາຍເລກທີ່ຢູ່ໃກ້ຊື່ຂອງລູກທ່ານຢູ່
ໃນບັດ ເມດີແຄຣ໌

2. ສະຖານະພາບໃນການມີເຊື້ອຊາດເປັນຄົນພື້ນເມືອງ

ບໍ່ແມ່ນ

ແມ່ນ, ເປັນຊາວ
ອາບໍຣິໂນລ

ແມ່ນ, ເປັນຊາວ ທໍເຣສເຕຣດ
ໄອແລນເດີ

ແມ່ນ, ເປັນທັງຊາວ ອາບໍຣິໂນລ
ແລະ ທໍເຣສເຕຣດ ໄອແລນເດີ

3. ຮາຍລະອຽດຂອງທ່ານ - ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງ

ຂ້ອຍໄດ້ອ່ານແລະໄດ້ເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເອົາໃຫ້ກ່ຽວກັບ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ
ບັນດາອາການຂ້າງຄຽງທີ່ອາດຈະມີ ຂອງ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ
Varicella.

ຂ້ອຍໃຫ້ການຍິນຍອມມາເນະທີ່ນີ້ສໍາລັບລູກຂ້ອຍທີ່ມີ ຊື່ຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້ ເພື່ອໃຫ້
ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ Varicella ຄັ້ງນີ້.

ຂ້ອຍປະຕິຍານ ຕາມທີ່ຂ້ອຍຮູ້ດີທີ່ສຸດ ວ່າ ລູກຂອງຂ້ອຍ:

- ບໍ່ເຄີຍມີອາການພູມແພ້ຢ່າງແຮງຫຼັງຈາກການສັກ ຢາປ້ອງກັນໂຮກໃດໆ.
- ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວ້ຕໍ່ອາການແພ້ອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ສ່ວນປະສົມຂອງຢາສັກ
ປ້ອງກັນໂຮກທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີ ຂອງປື້ມຂໍ້ມູນ ສໍາລັບພໍ່ແມ່ທີ່ຄັດຕິດມານີ້.
- ປັດຈຸບັນບໍ່ໄດ້ຖືພາ.

ຊື່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ (ຕົວຢ່າງ: JOHN SMITH)

ທີ່ຢູ່ (ຕົວຢ່າງ: 5 SMITH LANE)

ຄຸ້ມ

ຮະຫດໄປສະນີ

ນໍາເນີໂທຣະສັບມິຕິ

ເລກໂທຣະສັບຕິດຕໍ່ທີ່ດີອີກເລກນຶ່ງ (ຮວມທັງຮະຫັດເຂດ ຕົວຢ່າງ: 02)

ລາຍເຊັນຂອງພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ

ວັນທີ

 / / 2 0 

ບັນທຶກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ
Varicella (ໂຮກໝາກສຸກ)

ໃຫ້ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ
ຊື່ຂອງນັກຮຽນ (ຕົວຢ່າງ: JANE SMITH)

ສໍາລັບທ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ

ແຂນ ຊ້າຍ ເວລາຂອງການສັກຢາ (24ຊົ່ວໂມງ) ໝາຍເລກຂອງຢາສັກ

ຂວາ

ລາຍເຊັນຂອງພະຍາບານ

ວັນທີ

2 0

x

ຄວາມເຫັນຂອງພະຍາບານ

ເຫັນຜົນທີ່ບໍ່ສັກຢາ

- ຂາດໂຮງຮຽນ
- ປະຕິເສດ
- ບໍ່ສະບາຍ
- ບໍ່ມີລາຍເຊັນ
- ຖອນການຍິນຍອມ
- ອື່ນໆ

ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ບັນທຶກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ Varicella (ໂຮກໝາກສຸກ)

ບັນທຶກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ Varicella (ໂຮກໝາກສຸກ)

ໃຫ້ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ
ຊື່ຂອງນັກຮຽນ (ຕົວຢ່າງ: JANE SMITH)

ສໍາລັບທ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ

ແຂນ ຊ້າຍ ເວລາຂອງການສັກຢາ (24ຊົ່ວໂມງ) ໝາຍເລກຂອງຢາສັກ

ຂວາ

ລາຍເຊັນຂອງພະຍາບານ

ວັນທີ

2 0

x

ຕ້ອງເຮັດຫຍັງແຕ່ຫຼັງຈາກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ

- ເກັບບັນທຶກນີ້ໄວ້ ເພື່ອວ່າທ່ານອາດຈະຕ້ອງຖືກຂໍ ໃຫ້ເອົາຂໍ້ມູນນີ້ ໃຫ້ໃນພາຍຫຼັງ.
- ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນຂອງລູກທ່ານຈະຖືກອັບໂຫຼດ ອັດຕະໂນມັດໄປໃສ່ການລົງທະບຽນສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກອອສ ເຕຣເລີຍ (Australian Immunisation Register (AIR)). ທ່ານ ອາດຈະຕ້ອງການອັບເດດກັບນາຍໝໍ ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວັນທີ ຂອງການສັກຢາ.

ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າປະຕິກິລິຍາເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິເວນ ບ່ອນສັກຢາ

- ເອົາຜ້າຈຸ່ມນໍ້າເຢັນໝາດໆໃສ່ຢູ່ເທິງບ່ອນສັກຢາ ເພື່ອບັນເທົາ ອາການເຈັບປວດ.
- ກິນຢາ ພາຣາເຊຕາມອນ ຖ້າເຈັບປວດ.
- ຕື່ມນໍ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຖ້າລູກທ່ານເກີດມີປະຕິກິລິຍາທີ່ທ່ານເປັນກົງວັນ ກະຮຸນາຕິດຕໍ່ນາຍໝໍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ





ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກ ໂຮກຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ

Hepatitis B vaccine

ກົມ ອະນາໄມ ແຫ່ງຣັດ ນຊວ ສະເໜີການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ທີ່ ສະພາການຄົ້ນຄວ້າດ້ານສຸຂພາບແລະການແພດແຫ່ງຊາດໄດ້ ແນະນຳສໍາລັບໂຄງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກສໍາລັບພວກວັຍໜຸ່ມ ໃນໂຮງຮຽນ. ຕ້ອງມີໜັງສືຍິນຍອມທີ່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງເຊັນຮັບ.

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ

- ອ່ານເຈ້ຍຂໍ້ມູນ ນີ້ໃຫ້ດີ.
- ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ລູກທ່ານໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ ຈົ່ງຂຽນຕື່ມຟອມຍິນຍອມແລ້ວເອົາຟອມຍິນຍອມທີ່ ທ່ານເຊັນຮັບແລ້ວໃຫ້ລູກທ່ານນຳກັບໄປໃຫ້ ໂຮງຮຽນ.
- ຖ້າທ່ານ ບໍ່ ຕ້ອງການໃຫ້ລູກທ່ານສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ຕັບ ອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ ຢ່າ ຂຽນຕື່ມຟອມຍິນຍອມນັ້ນ ຫຼື ສົ່ງຟອມ ກັບໄປໃຫ້ໂຮງຮຽນ.

ຖ. ໂຮກຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຮກຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ ເປັນໂຮກທີ່ມີໄວຣັສທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີອາການຕ່າງໆເຊັ່ນ ເປັນໄຂ້ ໂຮກໝາກເຫຼືອງ ແລະ ຮູ້ສຶກອ່ອນເພັຍທົ່ວໄປ ແລະ ສາມາດນຳໄປສູ່ ໂຮກຕັບແຂງ ຫຼື ມະເຮັງໃນຕັບ. ບາງຄົນອາດມີໂຮກຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຕິດເຊື້ອໂຮກນີ້. ຄົນພວກນີ້ສາມາດແພ່ໂຮກນີ້ໄປຫາຄົນອື່ນໂດຍ ບໍ່ຮູ້ຕົວ.

ຖ. ໂຮກຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ ແພ່ຜ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ?

- ຈາກແມ່ທີ່ມີເຊື້ອໂຮກຫາລູກໃນເວລາຄອດ ແລະ ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຕົນເອງ
- ເດັກ-ຫາ-ເດັກ ໂດຍທັມມະດາແລ້ວແມ່ນໂດຍຜ່ານການສຳຜັດລະຫວ່າງການ ບາດເຈັບ ຫຼື ບາດແຜທີ່ບໍ່ຖືກປົກປິດ
- ເພດສຳພັນທີ່ບໍ່ປອດໄພ
- ການທີ່ມີບາດເຈັບໂດຍຖືກເຂັມແຫງ
- ສັກລາຍ ຫຼື ບ່ອງຕົນຕົວດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຂ້າເຊື້ອໂຮກ
- ໃຊ້ອຸປະກອນສັກຢາຮ່ວມກັນ

ຖ. ຢາວັກຊີນທຳການຢ່າງໃດ?

ຢາວັກຊີນທຳການໂດຍການໄປກະຕຸ້ນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດ ເຊື້ອໂຮກບາງຢ່າງ. ຖ້າວ່າຄົນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກແລ້ວມີການສຳຜັດ ກັບການຕິດ ເຊື້ອໂຮກເຫຼົ່ານີ້ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງພວກ ເຂົາກໍຈະສາມາດ ຕອບຮັບໄດ້ໂດຍມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງການປ້ອງກັນການຂະ ຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອໂຮກ ຫຼື ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງມັນໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ຖ. ຢາວັກຊີນມີປະສິດທິຜົນເທົ່າໃດ?

ຢາສັກກັນໂຮກ ຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ ມີປະສິດທິພາບສູງຫຼາຍໃນການໃຫ້ການ ປ້ອງກັນການຕິດໂຮກ ຕັບ ອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ.

ຖ. ມີການສັກຢາຈັກຄັ້ງໃນຊຸດນຶ່ງ?

ໃນ Intensive English Centres ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ ຈະສັກໃຫ້ຊຸດນຶ່ງສອງເຂັມ ແລ້ວຈະ ສັກຊຸດທີສອງອີກພາຍໃນລະຍະເວລາ 4 ຫາ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກການສັກຊຸດທີນຶ່ງ.

ຖ. ລູກຂ້ອຍຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກໂຮກຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ ຫຼືບໍ່ຖ້າ ລາວໄດ້ສັກຢາກັນໂຮກຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ ພຽງຄັ້ງດຽວ?

ບໍ່. ພວກວັຍຮຸ້ນ(ອາຍຸ 11 – 15ປີ) ຕ້ອງສັກຢາສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ສອງຄັ້ງເພື່ອຈະຖືກ ປ້ອງກັນຈາກໂຮກຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ ໄດ້.

ຖ. ແມ່ນໃຜທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢານີ້?

ນັກຮຽນໝົດທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 11-15ປີ ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ ສອງເຂັມ ນອກເສັຍຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ ເຄີຍໄດ້ຮັບການສັກຢານີ້ມາແລ້ວຊຸດນຶ່ງໃນເວລາເປັນທາຣົກ/ເດັກ.

ນັກຮຽນອາຍຸ 16 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າຄວນໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນເດັກ 3 ຄັ້ງ. ຢາ 2 ຄັ້ງ ທໍາ ອິດອາດຈະຖືກສັກໃຫ້ໃນໂຮງຮຽນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຈະມີຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ນຳໄປໃຫ້ GP ຂອງພວກເຂົາເພື່ອຈະໄດ້ສັກຢາໃຫ້ຄົບຊຸດ.

ຖ. ແມ່ນໃຜທີ່ບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢານີ້?

ຢາປ້ອງກັນໂຮກ ຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ ນີ້ ບໍ່ຄວນ ສັກໃຫ້ຜູ້ທີ່:

- ເຄີຍມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຫຼັງຈາກການສັກຢາຄັ້ງກ່ອນ
- ເຄີຍມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຫຼັງຈາກການສັກຢາທີ່ມີສ່ວນປະສົມໃດນຶ່ງຂອງ ຢາສັກ (ຈັດເປັນບັນຊີລາຍການໄວ້ຢູ່ໜ້າຕໍ່ໄປ)
- ບຸກຄົນທີ່ຖືພາ

ຖ. ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກປອດໄພເທົ່າໃດ?

ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍນີ້ແມ່ນປອດໄພຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານ ການກວດກາຢ່າງເຄັ່ງຄັດໂດຍ ອົງການຄວບຄຸມຢາເພື່ອການບໍາບັດ (TGA) ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ອົງການ (TGA) ຍັງໄດ້ຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພຂອງຢາສັກໃນເວລາທີ່ຖືກນຳໃຊ້ອີກດ້ວຍ.

ຖ. ຢາສັກກັນໂຮກ ຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ ບັນຈຸຫຍັງແດ່?

ຢາສັກກັນໂຮກຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ ບັນຈຸ aluminium hydroxide ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຢາທຳການ ແລະ ອາດຈະບັນຈຸທາດໂປຣຕີນຂອງຍີດສ໌ ແລະໄດ້ ສຳ ຜັດກັບວັດສະດຸທີ່ອອກມາຈາກ bovine ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ.

ຖ. ອາການຂ້າງຄຽງຂອງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ ມີຫຍັງແດ່?

ອາການຂ້າງຄຽງ ມີພຽງເບົາບາງ ແລະ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນຮອຍ ແດງ ມີອາການເຈັບ ແລະ ໃຄ່ຕາມບໍຣິເວນສັກຢາ ຫຼື ເປັນໄຂ້. ອາການຂ້າງ ຄຽງທີ່ຮ້າຍແຮງນັ້ນມີນ້ອຍທີ່ສຸດ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອາການຂ້າງ ຄຽງແມ່ນມີໄວ້ໃຫ້ທີ່ ກອງຂໍ້ມູນເລື່ອງຢາ ສໍາລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ [Consumer Medicine Information (CMI)] ສໍາລັບຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກແມ່ນມີໄວ້ທີ່ www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination. ບັນດາພໍ່ແມ່ທີ່ເປັນ ກົງວົນກ່ຽວກັບອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆຫຼັງຈາກການສັກຢານັ້ນ ຄວນຕິດຕໍ່ນາຍ ໝໍຂອງພວກເຂົາຜູ້ຊຶ່ງຈະເປັນຜູ້ລາຍງານໄປຫາພະແນກສຸຂພາບ ຊຸມຊົນໃນ ທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ.

ຖ. Anaphylaxis (ອາການແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ) ແມ່ນຫຍັງ?

Anaphylaxis ແມ່ນອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສລົບ ແລະ ຕາຍ ໄດ້ຖ້າບໍ່ປິ່ນປົວໃຫ້ໄວ. ມັນຈະເກີດໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ ຫຼັງຈາກການສັກຢາ. ພວກ ພະຍາບານທີ່ເຮັດວຽກດ້ານ ການສ້າງພູມຕໍານທານໂຮກຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນກໍໄດ້ ຮັບການຝຶກຫັດມາແລ້ວເປັນຢ່າງດີໃນການປິ່ນປົວອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງນີ້.

ຖ. ຂ້ອຍຄວນເຮັດຢ່າງໃດ ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ມີບັນທຶກ ຫຼື ຂ້ອຍບໍ່ຈື່ວ່າລູກ ຂອງຂ້ອຍໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ຕັບອັກ ເສບ ຊຸນິດ ບີ ຫຼືຍັງ?

ມັນຈະເປັນການປອດໄພທີ່ລູກຂອງທ່ານສັກຢາກັນໂຮກຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ ອີກຊຸດນຶ່ງ.

ຖ. ລູກຂ້ອຍໄດ້ຮັບການສັກຢາ Hib ແລ້ວ. ອັນນີ້ຈະປ້ອງກັນລູກ ຂອງຂ້ອຍຈາກໂຮກຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ ບໍ່?

ບໍ່. ຢາສັກ Hib ປ້ອງກັນຈາກໂຮກໄຂ້ຫວັດ ເຮໂມຟິລັສ ຊຸນິດ ບີ ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ສັກໃຫ້ ເດັກທາຣົກຕອນອາຍຸ 6ອາທິດ, 4 ເດືອນ, 6ເດືອນ ແລະ 18ເດືອນ. ມັນຈະບໍ່ປ້ອງກັນລູກຂອງທ່ານຈາກ ໂຮກ ຕັບອັກເສບ ຊຸນິດ ບີ.

ຖ. ຄວນສັກຢາກັນໂຮກນີ້ແກ່ນັກຮຽນຍິງທີ່ຖືພາຫຼື ຄິດວ່າລາວ ອາດຈະຖືພາ ບໍ່?

ບໍ່. ນັກຮຽນຍິງຜູ້ໃດທີ່ຖືພາ ຫຼື ຄິດວ່າລາວອາດຈະຖືພາບໍ່ຄວນສັກຢາກັນໂຮກ ນີ້. ໃນວັນທີ່ເປີດຄລິນິກ ພະຍາບານສັກຢາຈະຖາມບັນດານັກຮຽນຜູ້ຍິງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຖືພາ ຫຼື ຄິດວ່າອາດຈະຖືພາຫຼືບໍ່. ຖ້າຄໍາຕອບຂອງນັກຮຽນຕໍ່ຄໍາ ຖາມນີ້ວ່າ ແມ່ນ ລາວກໍຈະບໍ່ໄດ້ສັກຢາ. ນັກຮຽນກໍຈະຖືກແນະນໍາໃຫ້ປຶກສາຫາລື ບັນຫານີ້ກັບພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງຂອງລາວ ແລະ ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ ການແພດໃນທັນທີ. ນອກຈາກນີ້ລາວຍັງຈະໄດ້ຮັບຮາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ຂອງ ບໍຣິການການສົ່ງຕໍ່ດ້ານສຸຂພາບຊຶ່ງຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ການອຸ້ມຊູ ແລະ ການຊີ້ນໍາ.

ຖ. ຖ້າລູກຂ້ອຍເປັນໂຮກຫຼືດ ແລະ ກິນຢາ ກອັກຕີໂຊນ ຫຼື ເປຣັດນີ ໂຊນ ດ້ວຍການໃຊ້ “ອັນເປົ້າ” ເດ?

ຢາສັກ ປ້ອງກັນໂຮກ ຕັບອັກເສບ ປະເພດ ບີ ສາມາດສັກໃຫ້ໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ເປັນ ໂຮກຫຼືດໄດ້ໂດຍປອດໄພ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະພວກກິນຢາຫຍັງຢູ່.

ຖ. ແມ່ນໃຜສາມາດຍິນຍອມຕໍ່ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ແລະ ຈະສາມາດຖອນການຍິນຍອມໄດ້ບໍ່?

ມີແຕ່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຍິນຍອມຕໍ່ການສັກ ຢາປ້ອງກັນໂຮກ ສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18ປີ. ນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸ 18ປີແລະຫຼາຍກວ່າ ອາດຈະຍິນຍອມຕໍ່ການ ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄວນຂຽນ ຕື່ມ ພ້ອມທັງເຊັນຟອມຍິນຍອມບ່ອນທີ່ບັງບອກວ່າ ‘ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ’. ການຍິນຍອມສາມາດຖືກຖອນຄືນໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍການແຈ້ງໄປຫາທາງ ໂຮງຮຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເລື່ອງການຖອນການຍິນຍອມ ຫຼື ໂທຣະສັບ ຫາໂຮງຮຽນເພື່ອຖອນການຍິນຍອມນັ້ນ.

ຖ. ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດຖ້າລູກຂ້ອຍພາດຈາກການສັກຢາທີ່ ໂຮງຮຽນຍ້ອນເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ຂາດໂຮງຮຽນໃນມື້ທີ່ພະຍາບານມາ?

ທ່ານຄວນຕິດຕໍ່ນາຍໝໍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໄດ້ ສັກຢາ.

ຖ. ຂ້ອຍຈະເຂົ້າເຖິງບັນທຶກການສັກຢາໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນຂອງລູກທ່ານຈະຖືກອັບໂຫຼດໃສ່ທະບຽນສັກ ຢາປ້ອງກັນໂຮກ (AIR) ເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະຫວັດການສັກຢາ ປ້ອງກັນໂຮກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງລູກທ່ານ.

ບັນດາພໍ່ແມ່ສາມາດຂໍສໍາເນົາໃບລາຍງານປະຫວັດການສັກຢາ AIR ຂອງລູກ ພວກເຂົາໄດ້ທຸກເວລາ ຈົນຮອດລູກພວກເຂົາອາຍຸ 14 ປີຂຶ້ນໄປ, ແລະ ນັກຮຽນ ທີ່ມີອາຍຸ 14 ປີຂຶ້ນໄປສາມາດຂໍໃບປະກາດປະຫວັດການສັກຢາດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ ດັ່ງນີ້:

- ນໍາໃຊ້ບັນຊີ Medicare online ຜ່ານ myGov my.gov.au/
- ນໍາໃຊ້ແອັບ Medicare Express Plus www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
- ໂທຫາສາຍສອບຖາມທົ່ວໄປ AIR ທີ່ເບີ 1800 653 809.

ຖ. ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຂໍ້ມູນຂອງລູກຂ້ອຍ?

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານເອົາໃຫ້ຢູ່ຟອມຍິນຍອມການສັກຢາກັນໂຮກ ນັ້ນຈະມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ ຖືເປັນຄວາມລັບ ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນກົດໝາຍຢ່າງ ເຄັ່ງຄັດທີ່ມີຢູ່ໃນກົດໝາຍຂອງຣັດ NSW ແລະ ຣັຖບານກາງ (ເບິ່ງຢູ່ໃນຄໍາຖາ ແລງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ຄັດຕິດມາ). ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຖືກເອົາເຂົ້າໃສ່ໄວ້ຢູ່ໃນກອງ ທະບຽນການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ຂອງກົມອານາໄມ ຣັດ NSW ແລະ ແລ້ວ ກໍຈະຖືກອັບໂຫຼດເຂົ້າໄປຫາ ກອງລົງທະບຽນ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກແຫ່ງ ອອສເຕຣເລຍ (AIR) ເພື່ອວ່າຈະສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໄປຫາປະຫວັດການສັກຢາ ປ້ອງກັນໂຮກຂອງລູກທ່ານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ MyGov.

ຖ. ຂ້ອຍຈະຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໄດ້ຈາກໃສ?

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມມີໄວ້ໃຫ້:

- ໂດຍການເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຕ໌ຂອງກົມອະນາໄມແຫ່ງຣັດ ນຊວ ທີ່: www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
- ໂດຍການຕິດຕໍ່ ພະແນກ ອະນາໄມຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ທີ່ເບີ 1300 066 055



ຕ້ອງເຮັດຫຍັງແຕ່ຫຼັງຈາກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ

- ກັບບັນທຶກນີ້ໄວ້ ເພື່ອວ່າທ່ານອາດຈະຕ້ອງຖືກຂໍ ໃຫ້ເອົາຂໍ້ມູນນີ້ໃຫ້ໃນພາຍຫຼັງ.
- ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນຂອງລູກທ່ານຈະຖືກອັບໂຫຼດອັດຕະໂນມັດໄປໃສ່ການລົງທະບຽນສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກອອສເຕຣເລຍ (Australian Immunisation Register (AIR)). ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການອັບເດດກັບນາຍໝໍ ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວັນທີຂອງການສັກຢາ.

ຖ້າລູກທ່ານເກີດມີປະຕິກິຣິຍາທີ່ທ່ານເປັນກຽວ ກະຮຸນາຕິດຕໍ່ນາຍໝໍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ

ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າປະຕິກິລິຍາເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິດເວນບ່ອນສັກຢາ

- ເອົາຜ້າຈຸ່ມນໍ້າເຢັນໝາດໆໃສ່ຢູ່ເທິງບ່ອນສັກຢາ ເພື່ອບັນເທົາອາການເຈັບປວດ.
- ກິນຢາ ພາຣາເຊຕາມອນ ຖ້າເຈັບປວດ.
- ຕື່ມນໍ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຕ້ອງເຮັດຫຍັງແຕ່ຫຼັງຈາກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ

- ກັບບັນທຶກນີ້ໄວ້ ເພື່ອວ່າທ່ານອາດຈະຕ້ອງຖືກຂໍ ໃຫ້ເອົາຂໍ້ມູນນີ້ໃຫ້ໃນພາຍຫຼັງ.
- ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນຂອງລູກທ່ານຈະຖືກອັບໂຫຼດອັດຕະໂນມັດໄປໃສ່ການລົງທະບຽນສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກອອສເຕຣເລຍ (Australian Immunisation Register (AIR)). ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການອັບເດດກັບນາຍໝໍ ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວັນທີຂອງການສັກຢາ.

ຖ້າລູກທ່ານເກີດມີປະຕິກິຣິຍາທີ່ທ່ານເປັນກຽວ ກະຮຸນາຕິດຕໍ່ນາຍໝໍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ

ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າປະຕິກິລິຍາເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິດເວນບ່ອນສັກຢາ

- ເອົາຜ້າຈຸ່ມນໍ້າເຢັນໝາດໆໃສ່ຢູ່ເທິງບ່ອນສັກຢາ ເພື່ອບັນເທົາອາການເຈັບປວດ.
- ກິນຢາ ພາຣາເຊຕາມອນ ຖ້າເຈັບປວດ.
- ຕື່ມນໍ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.



ໃບຍິນຍອມສໍາລັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ຕັບອັກເສບ ຊະນິດ B



ໃຫ້ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ ກະຮຸນາຂຽນເປັນຕົວພິມໂດຍໃຊ້ປາກາສີດໍາ ຫຼື ສີຟ້າ.

1. ຮາຍລະອຽດຂອງນັກຮຽນ

ນາມສະກຸນ _____

ສະ _____

ວັນ ເດືອນ ປີເກີດ _____ / _____ / **2 0** _____ ແລດ _____ ຊົ່ມຮຽນ _____

ຜູ້ຊາຍ ແມ່ຍິງ ບໍ່ກຳນົດ/ລະຫວ່າງສອງ ແລດ/ບໍ່ລະບຸ _____

ຊື່ຂອງໂຮງຮຽນ _____

ນໍາເບີຂອງ ເມດີແຄຣ໌ _____ ໝາຍເລກທີ່ຢູ່ໃກ້ຊື່ຂອງລູກທ່ານຢູ່ ໃນບັດ ເມດີແຄຣ໌ _____

2. ສະຖານະພາບໃນການມີເຊື້ອຊາດເປັນຄົນພື້ນເມືອງ

ບໍ່ແມ່ນ ແມ່ນ, ເປັນຊາວ ອາບໍຣິຈິໂນລ ແມ່ນ, ເປັນຊາວ ທໍເຣສເຕຣດ ແມ່ນ, ເປັນທັງຊາວ ອາບໍຣິຈິໂນລ ແລະ ທໍເຣສເຕຣດ ໄອແລນເດີ

3. ຮາຍລະອຽດຂອງທ່ານ - ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງ

ຂ້ອຍໄດ້ອ່ານແລະໄດ້ເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເອົາໃຫ້ກ່ຽວກັບ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບັນດາອາການຂ້າງຄຽງທີ່ອາດຈະມີ ຂອງ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຕັບອັກເສບ ຊະນິດ B.

ຂ້ອຍໃຫ້ການຍິນຍອມມາະທີ່ນີ້ສໍາລັບລູກຂ້ອຍທີ່ມີ ຊື່ຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ຕັບອັກເສບ ຊະນິດ B ຊຸດນຶ່ງທີ່ມີ 2 ຂະນາດ.

ຊື່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ (ຕົວຢ່າງ: JOHN SMITH) _____

ທີ່ຢູ່ (ຕົວຢ່າງ: 5 SMITH LANE) _____

ຄຸ້ມ _____ ຮະຫັດໄປສະນີ _____

ນໍາເບີໂທຣະສັບມືຖື _____ ເລກໂທຣະສັບຕິດຕໍ່ທີ່ດີອີກເລກນຶ່ງ (ຮວມທັງຮະຫັດເຂດ ຕົວຢ່າງ: 02) _____

ລາຍເຊັນຂອງພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ _____ ວັນທີ _____ / _____ / **2 0** _____

ບັນທຶກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຕັບອັກເສບ
ຊະນິດ B

ໃຫ້ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ

ຊື່ຂອງນັກຮຽນ (ຕົວຢ່າງ: JANE SMITH)

ສໍາລັບຫ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ

ແນວ ຊ້າຍ ເວລາຂອງການສັກຢາ (24ຊົ່ວໂມງ) ໝາຍເລກຂອງຢາສັກ **ຂມາດຢາ 1**
ຂວາ :

ລາຍເຊັນຂອງພະຍາບານ ວັນທີ
x / 2 0

ແນວ ຊ້າຍ ເວລາຂອງການສັກຢາ (24ຊົ່ວໂມງ) ໝາຍເລກຂອງຢາສັກ **ຂມາດຢາ 2**
ຂວາ :

ລາຍເຊັນຂອງພະຍາບານ ວັນທີ
x / 2 0

ຄວາມເຫັນຂອງພະຍາບານ

ເຫັນຜົນທີ່ບໍ່ສັກຢາ

- ຂາດໂຮງຮຽນ
 ປະຕິເສດ
 ບໍ່ສະບາຍ
 ບໍ່ມີລາຍເຊັນ
 ຖອນການຍິນຍອມ
 ອື່ນໆ

ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ບັນທຶກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຕັບອັກເສບ ຊະນິດ B

ຂມາດຢາ 1

ບັນທຶກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຕັບອັກເສບ ຊະນິດ B

ໃຫ້ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ

ຊື່ຂອງນັກຮຽນ (ຕົວຢ່າງ: JANE SMITH)

ສໍາລັບຫ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ

ແນວ ຊ້າຍ ເວລາຂອງການສັກຢາ (24ຊົ່ວໂມງ) ໝາຍເລກຂອງຢາສັກ
ຂວາ :

ລາຍເຊັນຂອງພະຍາບານ ວັນທີ
x / 2 0

ບັນທຶກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຕັບອັກເສບ ຊະນິດ B

ຂມາດຢາ 2

ໃຫ້ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ

ຊື່ຂອງນັກຮຽນ (ຕົວຢ່າງ: JANE SMITH)

ສໍາລັບຫ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ

ແນວ ຊ້າຍ ເວລາຂອງການສັກຢາ (24ຊົ່ວໂມງ) ໝາຍເລກຂອງຢາສັກ
ຂວາ :

ລາຍເຊັນຂອງພະຍາບານ ວັນທີ
x / 2 0



ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກ ຫັດ ໂຮກໝາກເບີດ ແລະ ໂຮກ ຫັດເຢີຍຣະມັນ (MMR)

Measles, mumps and rubella (MMR) vaccine

ກົມ ອະນາໄມ ແຫ່ງຣັດ ນຊວ ສະເໜີການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ທີ່ ສະພາການຄົ້ນຄວ້າດ້ານສຸຂະພາບແລະການແພດແຫ່ງຊາດໄດ້ ແນະນຳສໍາລັບໂຄງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກສໍາລັບພວກວັຍໜຸ່ມ ໃນໂຮງຮຽນ. ຕ້ອງມີໜັງສືຍິນຍອມທີ່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງເຊັນຮັບ.

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ

- ອ່ານເຈ້ຍຂໍ້ມູນ ນີ້ໃຫ້ດີ.
- ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ລູກທ່ານໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຄໍຕິບ, ໂຮກບາດ ທະຍັກ ແລະ ໂຮກ ໄອໄກ່ ຈົ່ງຂຽນຕື່ມຟອມຍິນຍອມແລ້ວເອົາຟອມ ຍິນຍອມທີ່ທ່ານເຊັນຮັບແລ້ວໃຫ້ລູກທ່ານນຳກັບໄປໃຫ້ ໂຮງຮຽນ.
- ຖ້າທ່ານ ບໍ່ ຕ້ອງການໃຫ້ລູກທ່ານສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ຄໍຕິບ, ໂຮກບາດທະຍັກ ແລະ ໂຮກ ໄອໄກ່ ຢ່າ ຂຽນຕື່ມຟອມຍິນຍອມນັ້ນ ຫຼື ສົ່ງຟອມກັບໄປໃຫ້ໂຮງຮຽນ.

ຖ. ໂຮກຫັດ ໂຮກໝາກເບີດ ແລະ ໂຮກຫັດເຢີຍຣະມັນ (ຮູແບລລາ) ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຮກຫັດ ເປັນເຊື້ອໄວຣັສທີ່ຕິດຕໍ່ງ່າຍ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນໄຂ້ ໄອ ແລະ ຕຸ່ມຄັນ. ອາການແຊກຊ້ອນທີ່ມີເລື້ອຍໆຮວມມີ ໂຮກປອດບວມ, ອາການຖອກທ້ອງ ແລະ ຫູຊັ້ນກາງອັກເສບ. ການອັກເສບໃນສະໝອງຈະເກີດຂຶ້ນປະມານ 1 ໃນທຸກໆ 1,000 ກໍລະນີ ແລະ 10-15%ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້ຈະເສັຍຊີວິດ ແລະ ຫຼາຍຄົນຈະເປັນ ໂຮກສະໝອງພິການ ຕລອດຊີວິດ.

ໂຮກໝາກເບີດ ເປັນໂຮກຕິດຕໍ່ທີ່ກໍ່ໃຫ້ຕ່ອມຢູ່ຄໍໃສ່ຂຶ້ນ ແລະ ເປັນໄຂ້. ປະມານ10% ຂອງຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອຈະພັດທະນາໄປສູ່ການອັກເສບຂອງເຍື່ອຫຸ້ມສະ ໝອງ ແລະສາຍກະດູກສັນຫຼັງ (ສັນຍານ ແລະ ອາການຂອງໂຮກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງ ອັກເສບ) ໃນຂະນະທີ່15-30% ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຜ່ານວັຍໜຸ່ມແລ້ວຈະພັດທະນາ ໄປສູ່ການເປັນໂຮກໜ່ວຍອັນທະອັກ ເສບ (orchitis). ການຕິດໂຮກໝາກ ເບີດໃນຊ່ວງລະຍະສາມເດືອນທໍາອິດຂອງການຕັ້ງທ້ອງອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີ ການແຫ້ງລູກເອງໄດ້.

ໂຮກ ຮູແບລລາ (ໂຮກຫັດເຢີຍຣະມັນ) ເປັນໂຮກທີ່ຕິດຕໍ່ ດ້ວຍເຊື້ອໄວຣັສທີ່ກໍ່ ໃຫ້ເກີດຕຸ່ມຄັນ ເປັນໄຂ້ ແລະ ຕ່ອມໃສ່ຂຶ້ນ. ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກຢູ່ໃນທ້ອງ ແມ່ຍິງ ຖືພາມີຮູບຮ່າງພິການຢ່າງຮ້າຍແຮງໄດ້. ມີຈໍານວນສູງ ເຖິງ 90% ຂອງ ເດັກ ທີ່ຕິດ ໂຮກນີ້ໃນຊ່ວງລະຍະ ສາມ ເດືອນທໍາອິດຂອງການຕັ້ງທ້ອງ ຈະມີ ອາການຜິດປົກກະຕິ ມາຕັ້ງແຕ່ເກີດ ຮວມເຖິງຄວາມພິການທາງປັນຍາ, ຫູໜວກ ຕາບອດ ຫຼື ຫົວໃຈພິການ.

ຖ. ໂຮກຫັດ ໂຮກໝາກເບີດ ແລະ ໂຮກຮູແບລລາ ແມ່ຜາຍໄດ້ ຢ່າງໃດ?

ເຊື້ອໄວຣັສເຫຼົ່ານີ້ແຜ່ຜາຍໄດ້ໂດຍການໄອ ແລະ ຈາມ. ໂຮກຫັດເປັນນຶ່ງໃນບັນດາ ໂຮກທີ່ແຜ່ຜາຍ ແລະ ຕິດຕໍ່ງ່າຍທີ່ສຸດ. ພຽງແຕ່ຢູ່ຮ່ວມຫ້ອງກັບຜູ້ທີ່ເປັນໂຮກນີ້ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ຕິດແປດໄດ້.

ຖ. ຢາວັກຊີນທໍາການຢ່າງໃດ?

ຢາວັກຊີນທໍາການໂດຍການໄປກະຕຸ້ນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດ ເຊື້ອໂຮກບາງຢ່າງ. ຖ້າວ່າຄົນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກແລ້ວມີການສໍາຜັດ ກັບການຕິດ ເຊື້ອໂຮກເຫຼົ່ານີ້ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງພວກ ເຂົາກໍຈະສາມາດຕອບ ຮັບໄດ້ໂດຍມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງການປ້ອງກັນການຂະ ຫຍາຍຕົວ ຂອງເຊື້ອໂຮກ ຫຼື ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງມັນໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ຖ. ຢາວັກຊີນມີປະສິດທິຜົນເທົ່າໃດ?

ຢາສັກກັນໂຮກ MMR ມີປະສິດທິພາບສູງຫຼາຍໃນການ ປ້ອງກັນການຕິດໂຮກ ຫັດ ໂຮກໝາກເບີດ.

ຖ. ແມ່ນໃຜທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢານີ້?

ການສັກຢາປ້ອງກັນ ໂຮກຫັດ ໂຮກໝາກເບີດ ແລະ ໂຮກຮູແບລລາ (MMR) ສອງເທື່ອກໍພຽງພໍສໍາລັບວັຍຮຸ້ນເພື່ອສ້າງພູມຕ້ານທານອັນສົມບູນຈາກ ໂຮກຫັດ ໂຮກໝາກເບີດ ແລະ ໂຮກຮູແບລລາ ນອກຈາກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຄີຍໄດ້ ສັກຢານີ້ມາແລ້ວສອງເທື່ອ.

ຖ. ແມ່ນໃຜທີ່ບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢານີ້?

ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກ MMR ນີ້ ບໍ່ຄວນ ສັກໃຫ້ບຸກຄົນທີ່:

- ເຄີຍມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຫຼັງຈາກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ MMR ຄັ້ງກ່ອນ
- ເຄີຍມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຕໍ່ສ່ວນປະສົມໃດນຶ່ງຂອງຢາສັກ (ຕາມບັນຊີ ຢູ່ໜ້າຕໍ່ໄປ)
- ຖືພາ (ຄວນຫຼີກເວັ້ນການຖືພາ 28 ວັນຫຼັງຈາກການສັກຢາ)
- ເຄີຍໄດ້ຮັບການສັກຢາດ້ວຍເຊື້ອທີ່ມີຊີວິດພາຍໃນ 4 ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເຊັ່ນ ໂຮກ ວາຣິແຊລລາ (ໂຮກໝາກໄສ) BCG (ວັນນະໂຮກ) ຫຼື ໂຮກ ໝາກເຫຼືອງ
- ເຄີຍໄດ້ຮັບການປ່ຽນເລືອດ/ສັກຢາເພື່ອສ້າງພູມຕ້ານ ທານ ພາຍໃນປີທີ່ຜ່ານມາ
- ຂາດພູມຕ້ານທານ ເຊັ່ນ:
 - (i) ຄົນທີ່ມີໂຮກ ເຮັສໄອວີ/ເອດສ໌
 - (ii) ຄົນທີ່ກິນຢາ ສ້າງຄວາມສົມດຸນໃຫ້ຮ່າງກາຍ (corticosteroids) ຂະນາດຫຼາຍ
 - (iii) ຄົນທີ່ພວມຮັບການຮັກສາດ້ວຍຮະບົບທີ່ເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານຕໍາ, ການບໍາບັດດ້ວຍແສງຮັງສີ ຫຼື ເອັກຊ໌ເຣ
 - (iv) ຄົນທີ່ປ່ວຍສະພາບຮ້າຍແຮງຈາກຮະບົບເຊລເຍື່ອນ້ຳເຫຼືອງ ຮວມເຖິງ ເນື້ອງອກ ມະເຮັງມັດເລືອດຂາວ ແລະ ໂຮກ Hodgkin

ຖ. ຢາສັກກັນໂຮກ MMR ບັນຈຸທາດເສີມ ຫຍັງແດ່?

ຢາສັກ MMR ບັນຈຸ ທາດນ້ຳຕານ, ນິໂອມິຊິນ ນ້ຳກົດ ອານິໂມ ຊິບິໂທລ ແລະ ແມນນິໂທລ. ສ່ວນປະສົມດັ່ງກ່າວນີ້ມີຢູ່ໃນຢາສັກກັນໂຮກ ປະຣິມານນ້ອຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຢາກັນໂຮກທຳການ ຫຼື ທຳໜ້າທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຢາເສັຍ.

ຖ. ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກປອດໄພເທົ່າໃດ?

ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍນີ້ແມ່ນປອດໄພຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານ ການກວດກາຢ່າງເຄັ່ງຄັດໂດຍ ອົງການຄວບຄຸມຢາເພື່ອການບຳບັດ (TGA) ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ອົງການ (TGA) ຍັງໄດ້ຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພຂອງຢາສັກໃນເວລາທີ່ຖືກນຳໃຊ້ອີກດ້ວຍ.

ຖ. ອາການຂ້າງຄຽງຂອງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ MMR ມີຫຍັງແດ່?

ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກ MMR ປອດໄພ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີພະລັງຕ້ານ ທານດີ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວອາການຂ້າງຄຽງຈະມີພິເບົາບາງແລະອາດຮວມ ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ບໍ່ສະບາຍ ເປັນໄຂ້ ແລະ/ຫຼື ເປັນຕຸ່ມຄັນ (ຊຶ່ງບໍ່ເປັນອາ ການ ຕິດຕໍ່ ແລະ ອາດເກີດຂຶ້ນພາຍໃນລະຫວ່າງ 5-12 ມື້ ຫຼັງຈາກສັກຢາກັນໂຮກ MMR). ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ຮ້າຍແຮງ ຮວມເຖິງ ອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງ (ເບິ່ງ ຂໍ້ມູນຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ), ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງໃຄ່, (ລະຍະສົນ ເຈັບຕາມຂີ້) ແລະ ເກັດໃນເມັດ ເລືອດບໍ່ປົກກະຕິ (ອາການຟຶກຊ້າ/ເລືອດອອກຫຼາຍຂຶ້ນ) ແລະ ອາການດັ່ງກ່າວ ເກີດຂຶ້ນຍາກທີ່ສຸດ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອາການຂ້າງຄຽງແມ່ນມີໄວ້ໃຫ້ທີ່ ກອງຂໍ້ມູນເລື່ອງຢາ ສຳລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ [Consumer Medicine Information (CMI)] ສຳລັບຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກແມ່ນມີໄວ້ທີ່ www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination. ບັນດາພໍ່ແມ່ທີ່ເປັນກົງຈັກກ່ຽວກັບອາການຂ້າງຄຽງ ຕ່າງໆຫຼັງຈາກການສັກຢານັ້ນ ຄວນຕິດຕໍ່ນາຍໝໍຂອງພວກເຂົາຜູ້ຊຶ່ງຈະເປັນຜູ້ ລາຍງານໄປຫາພະແນກສຸຂະພາບ ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ.

ຖ. Anaphylaxis (ອາການແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ) ແມ່ນຫຍັງ?

Anaphylaxis ແມ່ນອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສລົບ ແລະ ຕາຍ ໄດ້ຖ້າບໍ່ປິ່ນປົວໃຫ້ໄວ. **ມັນຈະເກີດໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ ຫຼັງຈາກການສັກຢາ.** ພວກ ພະຍາບານທີ່ເຮັດວຽກດ້ານ ການສ້າງພູມຕ້ານທານໂຮກຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນກໍໄດ້ຮັບ ການຝຶກຫັດມາແລ້ວເປັນຢ່າງດີໃນການປິ່ນປົວອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງນີ້.

ຖ. ຄວນສັກຢາກັນໂຮກນີ້ແກ່ນັກຮຽນຍິງທີ່ຖືພາຫຼື ຄິດວ່າລາວ ອາດຈະຖືພາ ບໍ່?

ບໍ່. ນັກຮຽນຍິງຜູ້ໃດທີ່ຖືພາ ຫຼື ຄິດວ່າລາວອາດຈະຖືພາບໍ່ຄວນສັກຢາກັນໂຮກ ນີ້. ໃນວັນທີ່ເປີດຄລິນິກ ພະຍາບານສັກຢາຈະຖາມບັນດານັກຮຽນຜູ້ຍິງວ່າ ພວກ ເຂົາເຈົ້າຖືພາ ຫຼື ຄິດວ່າອາດຈະຖືພາຫຼືບໍ່. ຖ້າຄຳຕອບຂອງນັກຮຽນຕໍ່ຄຳຖາມນີ້ ວ່າ ແມ່ນ ລາວກໍຈະບໍ່ໄດ້ສັກຢາ. ນັກຮຽນກໍຈະຖືກແນະນຳໃຫ້ປຶກສາຫາລື ບັນຫາ ນີ້ກັບພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງຂອງລາວ ແລະ ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການ ແພດໃນທັນທີ. ນອກຈາກນີ້ລາວຍັງຈະໄດ້ຮັບຮາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ຂອງບໍຣິກາ ນການສັ່ງຕໍ່ດ້ານສຸຂະພາບຊຶ່ງຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳ ການອູ້ມູ ແລະ ການຊີ້ນຳ.

ບັນດານັກຮຽນຍິງທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ MMR ບໍ່ຄວນຖືພາ ພາຍໃນ 28 ມື້ຫຼັງຈາກການ ສັກຢານັ້ນ.

ຖ. ຖ້າລູກຂ້ອຍເປັນໂຮກຫຼື ແລະ ກິນຢາ ກອັກຕີໂຊນ ຫຼື ເປຣັດນີໂຊນ ດ້ວຍການໃຊ້ “ອັນເປ້າ” ເດ?

ຢາສັກ ປ້ອງກັນໂຮກ MMR ສາມາດສັກໃຫ້ໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ເປັນໂຮກຫຼືໄດ້ໂດຍປອດ ໄພ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະພວກກິນຢາຫຍັງຢູ່.

ຖ. ແມ່ນໃຜສາມາດຍິນຍອມຕໍ່ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ແລະ ຈະສາມາດຖອນການຍິນຍອມໄດ້ບໍ່?

ມີແຕ່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຍິນຍອມຕໍ່ການສັກ ຢາປ້ອງກັນໂຮກ ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ. ນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີແລະຫຼາຍກວ່າ ອາດຈະຍິນຍອມຕໍ່ການ ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄວນຂຽນຕື່ມ ພ້ອມທັງເຊັນຟອມຍິນຍອມບ່ອນທີ່ບັງບອກວ່າ ‘ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ’. ການຍິນຍອມສາມາດຖືກຖອນຄືນໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍການແຈ້ງໄປຫາທາງ ໂຮງຮຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເລື່ອງການຖອນການຍິນຍອມ ຫຼື ໂທຣະສັບຫາ ໂຮງຮຽນເພື່ອຖອນການຍິນຍອມນັ້ນ.

ຖ. ຂ້ອຍຈະເຂົ້າເຖິງບັນທຶກການສັກຢາໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນຂອງລູກທ່ານຈະຖືກອັບໂຫຼດໃສ່ທະບຽນສັກ ຢາປ້ອງກັນໂຮກ (AIR) ເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະຫວັດການສັກຢາ ປ້ອງກັນໂຮກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງລູກທ່ານ.

ບັນດາພໍ່ແມ່ສາມາດຂໍສຳເນົາໃບລາຍງານປະຫວັດການສັກຢາ AIR ຂອງລູກ ພວກເຂົາໄດ້ທຸກເວລາ ຈົນຮອດລູກພວກເຂົາອາຍຸ 14 ປີຂຶ້ນໄປ, ແລະ ນັກຮຽນ ທີ່ມີອາຍຸ 14 ປີຂຶ້ນໄປສາມາດຂໍໃບປະກາດປະຫວັດການສັກຢາດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ ດັ່ງນີ້:

- ນຳໃຊ້ບັນຊີ Medicare online ຜ່ານ myGov [my.gov.au/](http://my.gov.au)
- ນຳໃຊ້ແອັບ Medicare Express Plus www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
- ໂທຫາສາຍສອບຖາມທົ່ວໄປ AIR ທີ່ເບີ 1800 653 809.

ຖ. ຂ້ອຍຈະເຮັດຢ່າງໃດໄດ້ແຕ່ຖ້າລູກຂ້ອຍພາດຈາກການສັກຢາ ຢູ່ໂຮງຮຽນຍ້ອນວ່າປ່ວຍ ຫຼື ຂາດໂຮງຮຽນ ໃນມື້ທີ່ພະຍາບານມາ ໂຮງຮຽນ?

ທ່ານຄວນຕິດຕໍ່ນາຍໝໍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໄດ້ ສັກຢາ.

ຖ. ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຂໍ້ມູນຂອງລູກຂ້ອຍ?

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານເອົາໃຫ້ຢູ່ຟອມຍິນຍອມການສັກຢາກັນໂຮກ ນັ້ນຈະມີຖິ່ນໄຂໃຫ້ ຖືເປັນຄວາມລັບ ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນກົດໝາຍຢ່າງ ເຄັ່ງຄັດທີ່ມີຢູ່ໃນກົດໝາຍຂອງຣັດ NSW ແລະ ຣັຖບານກາງ (ເບິ່ງຢູ່ໃນຄຳຖແລງ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ຄັດຕິດມາ). ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຖືກເອົາເຂົ້າໃສ່ໄວ້ຢູ່ໃນກອງທະບຽນ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ຂອງກົມອານາໄມ ຣັດ NSW ແລະ ແລ້ວກໍຈະຖືກອັບ ໂຫຼດເຂົ້າໄປຫາ ກອງລົງທະບຽນ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກແຫ່ງ ອອສເຕຣເລຍ (AIR) ເພື່ອວ່າຈະສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໄປຫາປະຫວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ຂອງລູກທ່ານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ MyGov.

ຖ. ຂ້ອຍຈະຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໄດ້ຈາກໃສ?

- ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມມີໄວ້ໃຫ້:
- ໂດຍການເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຕ໌ຂອງກົມອະນາໄມແຫ່ງຣັດ ນຊວ ທີ່: www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
- ໂດຍການຕິດຕໍ່ ພະແນກ ອະນາໄມຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ທີ່ເບີ 1300 066 055

ໃຫ້ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ
ຊື່ຂອງນັກຮຽນ (ຕົວຢ່າງ: JANE SMITH)

ສໍາລັບຫ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ

ແຂວງ ຊຳຍ ເວລາຂອງການສັກຢາ (24ຊົ່ວໂມງ) ໝາຍເລກຂອງຢາສັກ **ຂນາດຢາ 1**

ຂວາ

ລາຍເຊັນຂອງພະຍາບານ

ວັນທີ

2 0

ແຂວງ ຊຳຍ ເວລາຂອງການສັກຢາ (24ຊົ່ວໂມງ) ໝາຍເລກຂອງຢາສັກ **ຂນາດຢາ 2**

ຂວາ

ລາຍເຊັນຂອງພະຍາບານ

ວັນທີ

x

ຄວາມເຫັນຂອງພະຍາບານ

ເຫັນຜົນທີ່ບໍ່ສັກຢາ

- ຂາດໂຮງຮຽນ
 ປະຕິເສດ
 ບໍ່ສະບາຍ
 ບໍ່ມີລາຍເຊັນ
 ຖອນການຍິນຍອມ
 ອື່ນໆ

ບັນທຶກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ MMR

ຂນາດຢາ 1

ໃຫ້ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ
ຊື່ຂອງນັກຮຽນ (ຕົວຢ່າງ: JANE SMITH)

ສໍາລັບຫ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ

ແຂວງ ຊຳຍ ເວລາຂອງການສັກຢາ (24ຊົ່ວໂມງ) ໝາຍເລກຂອງຢາສັກ

ຂວາ

ລາຍເຊັນຂອງພະຍາບານ

ວັນທີ

2 0

x

a ບັນທຶກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ MMR

ຂນາດຢາ 2

ໃຫ້ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ
ຊື່ຂອງນັກຮຽນ (ຕົວຢ່າງ: JANE SMITH)

ສໍາລັບຫ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ

ແຂວງ ຊຳຍ ເວລາຂອງການສັກຢາ (24ຊົ່ວໂມງ) ໝາຍເລກຂອງຢາສັກ

ຂວາ

ລາຍເຊັນຂອງພະຍາບານ

ວັນທີ

2 0

x



ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກໂປລີໂອ

Polio vaccine

ກົມ ອະນາໄມ ແຫ່ງຣັດ ນຊວ ສະເໜີການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ທີ່ ສະພາການຄົ້ນຄວ້າດ້ານສຸຂະພາບແລະການແພດແຫ່ງຊາດໄດ້ ແນະນຳສໍາລັບໂຄງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກສໍາລັບພວກວັຍຫຸ່ມ ໃນໂຮງຮຽນ. ຕ້ອງມີໜັງສືຍິນຍອມທີ່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງເຊັນຮັບ.

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ

- ອ່ານເຈ້ຍຂໍ້ມູນ ນີ້ໃຫ້ດີ.
- ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ລູກທ່ານໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກໂປລີໂອ ຈົ່ງຂຽນຕື່ມຟອມຍິນຍອມແລ້ວເອົາຟອມຍິນຍອມທີ່ທ່ານເຊັນຮັບ ແລ້ວໃຫ້ລູກທ່ານນຳກັບໄປໃຫ້ ໂຮງຮຽນ.
- ຖ້າທ່ານ ບໍ່ ຕ້ອງການໃຫ້ລູກທ່ານສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ໂປລີໂອ ຢ່າ ຂຽນຕື່ມຟອມຍິນຍອມນັ້ນ ຫຼື ສົ່ງຟອມກັບໄປໃຫ້ໂຮງຮຽນ.

ຖ. ໂຮກ ໂປລີໂອ (ວັດຖຸສີເຖົ້າຂອງໄຂສັນຫຼັງອັກເສບ) ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຮກໂປລີໂອແມ່ນໂຮກຕິດຕໍ່ທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສໂປລີໂອຊຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ ເປັນອາໄມະພາດ ແລະເສຍຊີວິດໄດ້. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄົນທີ່ຕິດ ເຊື້ອໂຮກໂປລີ ໂອຈະບໍ່ມີອາການໃດໆ. ການ ເປັນໄຂ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ ເຈັບຫົວ ມີອາການຊຶມ ປວດ ຮາກແລະຮາກຈະເກີດຂຶ້ນໃນປະມານ 10% ຂອງຜູ້ທີ່ຕິດໂຮກນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ສ່ວນຫຼາຍຂອງ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະເຊົາຂາດຈາກໂຮກນີ້ ແຕ່ມີປະມານ 2% ທີ່ຈະສືບຕໍ່ ມີອາການເຈັບປວດຢ່າງໜັກຕາມ ກ້າມເນື້ອທາງຫຼັງ ຫຼື ຄໍແຂງທີ່ເກີດຈາກເນື້ອ ເຍື່ອຫຸ້ມ ສມອງອັກເສບ. ໜ້ອຍກວ່າ 1% ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂຮກນີ້ຈະມີອາການ ອ່ອນເພັຍທີ່ເອີ້ນວ່າ ອັມມະພາດອ່ອນເພັຍອັນຮ້າຍແຮງຊຶ່ງສາມາດກະທົບຕໍ່ ແຂນຂາ, ກ້າມເນື້ອຢູ່ຫົວແລະຄໍ ແລະ ບັນດາ ກ້າມເນື້ອທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຫາຍໃຈ.

ຖ. ໂຮກໂປລີໂອແພ່ຜາຍໄດ້ຢ່າງໃດ?

ໂຮກໂປລີໂອແພ່ຜາຍໄດ້ດ້ວຍການພົວພັນແບບໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໂຮກ ແລ້ວໂດຍຜ່ານການສໍາຜັດຖືກອາຈົມ(ຕົວຢ່າງຢູ່ມືທີ່ບໍ່ໄດ້ລ້າງ) ຫຼື ນໍ້າລາຍ ຈາກຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂຮກ. ເຊື້ອໄວຣັສໂປລີໂອເຂົ້າໄປ ໃນຮ່າງກາຍໂດຍຜ່ານ ທາງດັງຫຼື ປາກ ແລະ ການ ຕິດແປດເລີ່ມຈາກໃນຊ່ອງທ້ອງ. ຕໍ່ມາມັນກໍຈະເຂົ້າໄປ ໃນເສັ້ນເລືອດແລະຈະນໍາຕໍ່ໄປຫາສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ຮ່າງກາຍຮວມເຖິງລະບົບເສັ້ນ ປະສາດ. ບັນດາກໍ ຣະນີຕ່າງໆສ່ວນຫຼາຍຈະຕິດເຊື້ອໄດ້ພາຍໃນເວລາ ກ່ອນ 10 ມື້ ແລະ ຫຼັງ 10 ມື້ຂອງການອອກຣິດຂອງ ອາການ.

ຖ. ຢາວັກຊີນທໍາການຢ່າງໃດ?

ຢາວັກຊີນທໍາການໂດຍການໄປກະຕຸ້ນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດ ເຊື້ອໂຮກບາງຢ່າງ. ຖ້າວ່າຄົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກແລ້ວມີການສໍາຜັດ ກັບການຕິດ ເຊື້ອໂຮກເຫຼົ່ານີ້ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງພວກ ເຂົາກໍຈະສາມາດ ຕອບຮັບໄດ້ໂດຍມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງການປ້ອງກັນການຂະ ຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອໂຮກ ຫຼື ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງມັນໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ຖ. ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກໂປລີໂອມີປະສິດທິພາບ ຢ່າງໃດ?

ຢາສາມເຂັ້ມຂອງຊຸດທໍາອິດຂອງຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກ ໂປລີໂອມີປະສິດທິພາບ ຢ່າງຕໍ່າ 99% ໃນການຕໍ່ຕ້ານໂຮກນີ້.

ຖ. ແມ່ນໃຜທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢານີ້?

ບັນດານັກຮຽນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນ ໂຮກໂປລີໂອຊຸດທໍາອິດ (ສາມເຂັ້ມຢ່າງຕໍ່າທ່າງກັນ 4 ອາ ທິດ) ຄວນສັກຢານີ້. ໃນ ຂະນະທີ່ນັກຮຽນສ່ວນ ຫຼາຍຈະໄດ້ ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກໂປລີໂອຢ່າງຕໍ່າໜຶ່ງຊຸດ ແຕ່ນັກຮຽນທີ່ ຮຽນຢູ່ ສູນຮຽນພາສາອັງກິດແບບເຂັ້ມງວດ (Intensive English Centres) ຈະໄດ້ຮັບ 2 ຊຸດ ແລະ ບັນດາພໍ່ແມ່ຈະຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບເພື່ອ ໃຫ້ໄປຫາພາຍໜ້າໃນ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສັກຢາຊຸດທີສາມ, ຖ້າຈໍາເປັນ.

ຖ. ແມ່ນໃຜທີ່ບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢານີ້?

- ຢາປ້ອງກັນໂຮກ ໂປລີໂອ ນີ້ບໍ່ຄວນສັກໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່:
- ເຄີຍມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຫຼັງຈາກການສັກຢາຄັ້ງກ່ອນ
 - ເຄີຍມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຕໍ່ສ່ວນປະສົມໃດໜຶ່ງຂອງຢາສັກ (ຈັດເປັນບັນຊີລາຍການໄວ້ຢູ່ໜ້າຕໍ່ໄປ)

ຖ. Anaphylaxis (ອາການແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ) ແມ່ນຫຍັງ?

Anaphylaxis ແມ່ນອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສລົບ ແລະ ຕາຍໄດ້ຖ້າບໍ່ປິ່ນປົວໃຫ້ໄວ.

ມັນຈະເກີດໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ ຫຼັງຈາກການສັກຢາ. ພວກພະຍາບານທີ່ເຮັດວຽກ ດ້ານ ການສ້າງພູມຕ້ານທານໂຮກຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນກໍໄດ້ຮັບການເຝິກຫັດມາແລ້ວ ເປັນຢ່າງດີໃນການປິ່ນປົວອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງນີ້.

ຖ. ຂ້ອຍຄວນຈະເຮັດແນວໃດຖ້າຂ້ອຍບໍ່ມີບັນທຶກ ຫຼື ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດ ຈື່ໄດ້ວ່າລູກຂ້ອຍໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນ ໂຮກໂປລີໂອແລ້ວ?

ເດັກນ້ອຍຫຼືຜູ້ໃຫຍ່ສາມາດສັກຢາປ້ອງກັນ ໂຮກໂປລີໂອໄດ້ດ້ວຍຄວາມປອດ ພ້ອມຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີ ຫຼັກຖານຂອງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ໂປລີໂອມາກ່ອນ.

ຖ. ຢາສັກກັນໂຮກໂປລີໂອນີ້ບັນຈຸຫຍັງແດ່?

ຢາສັກກັນ ບັນຈຸ phenoxyethanol, formaldehyde, polysorbate 80 ແລະ neomycin ໜ້ອຍນຶ່ງ, streptomycin, polymyxin B ແລະ bovine serum albumin.

ສ່ວນປະສົມດັ່ງກ່າວນີ້ມີຢູ່ໃນຢາສັກກັນໂຮກ ປະຣິມານນ້ອຍທີ່ສຸດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຢາກັນໂຮກທຳງານ ຫຼື ທຳໜ້າທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຢາເສີຍ.

ຢາວັກຊີນນີ້ໄດ້ ສຳ ຜັດກັບວັດສະດຸທີ່ອອກມາຈາກ bovine (ສັດໃຫຍ່ເຊັ່ນງົວ) ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ.

ຖ. ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກປອດໄພເທົ່າໃດ?

ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍນີ້ແມ່ນປອດໄພຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານການກວດກາຢ່າງເຄັ່ງຄັດໂດຍ ອົງການຄວບຄຸມຢາເພື່ອການບຳບັດ (TGA) ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ອົງການ (TGA) ຍັງໄດ້ຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພຂອງຢາສັກໃນເວລາທີ່ຖືກນຳໃຊ້ອີກດ້ວຍ.

ຖ. ອາການຂ້າງຄຽງຂອງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ໂປລີໂອນີຫຍັງແດ່?

ອາການຂ້າງຄຽງ ມີພຽງເບົາບາງ ແລະ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນຮອຍແດງ ມີອາການເຈັບ ແລະ ໃຄ່ຕາມບໍຣິເວນສັກຢາ ຫຼື ເປັນໄຂ້. ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ຮ້າຍແຮງນັ້ນມີນ້ອຍທີ່ສຸດ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອາການຂ້າງຄຽງແມ່ນມີໄວ້ໃຫ້ທີ່ ກອງຂໍ້ມູນເລື່ອງຢາ ສຳລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ [Consumer Medicine Information (CMI)] ສຳລັບຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກແມ່ນມີໄວ້ທີ່ www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination. ບັນດາພໍ່ແມ່ທີ່ເປັນກັງວົນກ່ຽວກັບອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆຫຼັງຈາກການສັກຢານັ້ນ ຄວນຕິດຕໍ່ນາຍໜີ້ຂອງພວກເຂົາຜູ້ຊຶ່ງຈະເປັນຜູ້ລາຍງານໄປຫາພະແນກສຸຂະພາບ ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ.

ຖ. ຄວນສັກຢາກັນໂຮກນີ້ແກ່ນັກຮຽນຍິງທີ່ຖືພາຫຼື ຄິດວ່າລາວອາດຈະຖືພາ ບໍ່?

ບໍ່. ນັກຮຽນຍິງຜູ້ໃດທີ່ຖືພາ ຫຼື ຄິດວ່າລາວອາດຈະຖືພາບໍ່ຄວນສັກຢາກັນໂຮກນີ້. ໃນວັນທີ່ເປີດຄລິນິກ ພະຍາບານສັກຢາຈະຖາມບັນດານັກຮຽນຜູ້ຍິງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຖືພາ ຫຼື ຄິດວ່າອາດຈະຖືພາຫຼືບໍ່. ຖ້າຄຳຕອບຂອງນັກຮຽນຕໍ່ຄຳຖາມນີ້ວ່າ ແມ່ນ ລາວກໍຈະບໍ່ໄດ້ສັກຢາ. ນັກຮຽນກໍຈະຖືກແນະນຳໃຫ້ປຶກສາຫາລື ບັນຫານີ້ກັບພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງຂອງລາວ ແລະ ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການແພດໃນທັນທີ. ນອກຈາກນີ້ລາວຍັງຈະໄດ້ຮັບຮາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ຂອງບໍຣິການການສັ່ງຕໍ່ດ້ານສຸຂະພາບຊຶ່ງຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳ ການອຸ້ມຊູ ແລະ ການຊີ້ນຳ.

ຖ. ຖ້າລູກຂ້ອຍເປັນໂຮກຫຼືດ ແລະ ກິນຢາ ກອັກຕິໂຊນ ຫຼື ເປຣັດນີໂຊນ ດ້ວຍການໃຊ້ “ອັນເປົ່າ” ເດ?

ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກ ໂປລີໂອ ສາມາດສັກໃຫ້ໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ເປັນໂຮກຫຼືດໄດ້ໂດຍປອດໄພ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະພວກກິນຢາຫຍັງຢູ່.

ຖ. ແມ່ນໃຜສາມາດຍິນຍອມຕໍ່ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ແລະ ຈະສາມາດຖອນການຍິນຍອມໄດ້ບໍ່?

ມີແຕ່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຍິນຍອມຕໍ່ການສັກ ຢາປ້ອງກັນໂຮກສຳລັບນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ. ນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີແລະຫຼາຍກວ່າອາດຈະຍິນຍອມຕໍ່ການ ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄວນຂຽນຕື່ມພ້ອມທັງເຊັນຟອມຍິນຍອມບ່ອນທີ່ບັງບອກວ່າ ‘ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ’.

ການຍິນຍອມສາມາດຖືກຖອນຄືນໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍການແຈ້ງໄປຫາທາງໂຮງຮຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເລື່ອງການຖອນການຍິນຍອມ ຫຼື ໂທຣະສັບຫາໂຮງຮຽນເພື່ອຖອນການຍິນຍອມນັ້ນ.

ຖ. ຂ້ອຍຈະເຂົ້າເຖິງບັນທຶກການສັກຢາໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນຂອງລູກທ່ານຈະຖືກອັບໂຫຼດໃສ່ທະບຽນສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ (AIR) ເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະຫວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງລູກທ່ານ.

ບັນດາພໍ່ແມ່ສາມາດຂໍສຳເນົາໃບລາຍງານປະຫວັດການສັກຢາ AIR ຂອງລູກພວກເຂົາໄດ້ທຸກເວລາ ຈົນຮອດລູກພວກເຂົາອາຍຸ 14 ປີຂຶ້ນໄປ, ແລະ ນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸ 14 ປີຂຶ້ນໄປສາມາດຂໍໃບປະກາດປະຫວັດການສັກຢາດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ນຳໃຊ້ບັນຊີ Medicare online ຜ່ານ myGov my.gov.au/
- ນຳໃຊ້ແອັບ Medicare Express Plus www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
- ໂທຫາສາຍສອບຖາມທົ່ວໄປ AIR ທີ່ເບີ 1800 653 809.

ຖ. ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດຖ້າລູກຂ້ອຍພາດຈາກການສັກຢາທີ່ໂຮງຮຽນຍ້ອນເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ຂາດໂຮງຮຽນໃນມື້ທີ່ພະຍາບານມາ?

ທ່ານຄວນຕິດຕໍ່ນາຍໜີ້ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໄດ້ສັກຢາ.

ຖ. ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຂໍ້ມູນຂອງລູກຂ້ອຍ?

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານເອົາໃຫ້ຢູ່ຟອມຍິນຍອມການສັກຢາກັນໂຮກ ນັ້ນຈະມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ຖືເປັນຄວາມລັບ ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດທີ່ມີຢູ່ໃນກົດໝາຍຂອງລັດ NSW ແລະ ຣັຖບານກາງ (ເບິ່ງຢູ່ໃນຄຳຖາມແລງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ຄັດຕິດມາ). ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຖືກເອົາເຂົ້າໃສ່ໄວ້ຢູ່ໃນກອງທະບຽນການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ຂອງກົມອານາໄມ ຣັດ NSW ແລະ ແລ້ວກໍຈະຖືກອັບໂຫຼດເຂົ້າໄປຫາ ກອງລົງທະບຽນ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກແຫ່ງອອສເຕຣເລຍ (AIR) ເພື່ອວ່າຈະສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໄປຫາປະຫວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຂອງລູກທ່ານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ MyGov.

ຖ. ຂ້ອຍຈະຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໄດ້ຈາກໃສ?

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມມີໄວ້ໃຫ້:

- ໂດຍການເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຕ໌ຂອງກົມອະນາໄມແຫ່ງລັດ ນຊວ ທີ່: www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
- ໂດຍການຕິດຕໍ່ ພະແນກ ອະນາໄມຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ທີ່ເບີ 1300 066 055



ຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ຫຼັງຈາກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ

- ເກັບບັນທຶກນີ້ໄວ້ ເພື່ອວ່າທ່ານອາດຈະຕ້ອງຖືກຂໍ ໃຫ້ເອົາຂໍ້ມູນນີ້ໃຫ້ໃນພາຍຫຼັງ.
- ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນຂອງລູກທ່ານຈະຖືກອັບໂຫຼດອັດຕະໂນມັດໄປໃສ່ການລົງທະບຽນສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກອອສເຕຣເລຍ (Australian Immunisation Register (AIR)). ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການອັບເດດກັບນາຍໝໍ ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວັນທີຂອງການສັກຢາ.

ຖ້າລູກທ່ານເກີດມີປະຕິກິຣິຍາທີ່ທ່ານເປັນກຽວ ກະຮຸນາຕິດຕໍ່ນາຍໝໍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ

ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າປະຕິກິລິຍາເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິດເວນບ່ອນສັກຢາ

- ເອົາຜ້າຈຸ່ມນໍ້າເຢັນໝາດໆໃສ່ຢູ່ເທິງບ່ອນສັກຢາ ເພື່ອບັນເທົາອາການເຈັບປວດ.
- ກິນຢາ ພາຣາເຊຕາມອນ ຖ້າເຈັບປວດ.
- ຕື່ມນໍ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ຫຼັງຈາກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ

- ເກັບບັນທຶກນີ້ໄວ້ ເພື່ອວ່າທ່ານອາດຈະຕ້ອງຖືກຂໍ ໃຫ້ເອົາຂໍ້ມູນນີ້ໃຫ້ໃນພາຍຫຼັງ.
- ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນຂອງລູກທ່ານຈະຖືກອັບໂຫຼດອັດຕະໂນມັດໄປໃສ່ການລົງທະບຽນສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກອອສເຕຣເລຍ (Australian Immunisation Register (AIR)). ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການອັບເດດກັບນາຍໝໍ ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວັນທີຂອງການສັກຢາ.

ຖ້າລູກທ່ານເກີດມີປະຕິກິຣິຍາທີ່ທ່ານເປັນກຽວ ກະຮຸນາຕິດຕໍ່ນາຍໝໍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ

ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າປະຕິກິລິຍາເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິດເວນບ່ອນສັກຢາ

- ເອົາຜ້າຈຸ່ມນໍ້າເຢັນໝາດໆໃສ່ຢູ່ເທິງບ່ອນສັກຢາ ເພື່ອບັນເທົາອາການເຈັບປວດ.
- ກິນຢາ ພາຣາເຊຕາມອນ ຖ້າເຈັບປວດ.
- ຕື່ມນໍ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.



ໃບຢືນຍອມສໍາລັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກໂປລິໂອ

ໃຫ້ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ ກະຮຸນາຂຽນເປັນຕົວພິມໂດຍໃຊ້ປາກກາສິດໍາ ຫຼື ສີຟ້າ.

1. ຣາຍລະອຽດຂອງນັກຮຽນ

ນາມສະກຸນ _____

ຊື່ _____

ວັນ ເດືອນ ປີເກີດ _____ / _____ / **2 0** _____ ແມດ _____ ຊັ້ນຮຽນ _____

ຜູ້ຊາຍ ແມ່ຍິງ ບໍ່ກຳນົດ/ລະຫວ່າງສອງ ເພດ/ບໍ່ລະບຸ _____

ຊື່ຂອງໂຮງຮຽນ _____

ນໍາເບີຂອງ ເມດີແຄຣ໌ _____ ໝາຍເລກທີ່ຢູ່ໃກ້ຊື່ຂອງລູກທ່ານຢູ່ໃນບັດ ເມດີແຄຣ໌ _____

2. ສະຖານະພາບໃນການມີເຊື້ອຊາດເປັນຄົນພື້ນເມືອງ

ພໍ່ແມ່ນ ແມ່ນ, ເປັນຊາວ ອາບໍຣິຈິໂນລ ແມ່ນ, ເປັນຊາວ ທໍເຣສເຕຣດ ໄອແລນເດີ ແມ່ນ, ເປັນທັງຊາວ ອາບໍຣິຈິໂນລ ແລະ ທໍເຣສເຕຣດ ໄອແລນເດີ

3. ຣາຍລະອຽດຂອງທ່ານ - ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງ

ຂ້ອຍໄດ້ອ່ານແລະໄດ້ເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເອົາໃຫ້ກ່ຽວກັບ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບັນດາອາການຂ້າງຄຽງທີ່ອາດຈະມີ ຂອງ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ໂປລິໂອ.

ຂ້ອຍໃຫ້ການຍິນຍອມມານະທີ່ນີ້ສໍາລັບລູກຂ້ອຍທີ່ມີຊື່ຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກໂປລິໂອ ຊຸດນຶ່ງທີ່ມີ 2 ຂນາດ.

ຂ້ອຍປະຕິຍານ ຕາມທີ່ຂ້ອຍຮູ້ດີທີ່ສຸດ ວ່າ ລູກຂອງຂ້ອຍ:

1. ບໍ່ເຄີຍມີອາການພູມແພ້ຢ່າງແຮງຫຼັງຈາກການສັກ ຢາປ້ອງກັນໂຮກໃດໆ.
2. ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວ້ຕໍ່ອາການແພ້ອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ສ່ວນປະສົມຂອງຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີ ຂອງປຶ້ມຂໍ້ມູນ ສໍາລັບພໍ່ແມ່ທີ່ຄັດຕິດມານີ້.
3. ປັດຈຸບັນບໍ່ໄດ້ຖືພາ.

ຊື່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ (ຕົວຢ່າງ: JOHN SMITH) _____

ທີ່ຢູ່ (ຕົວຢ່າງ: 5 SMITH LANE) _____

ຄຸ້ມ _____ ຮະຫວັດໄປສະນີ _____

ນໍາເບີໂທຣະສັບນີ້ຖື _____ ເລກໂທຣະສັບຕິດຕໍ່ທີ່ດີອີກເລກນຶ່ງ (ຮວມທັງຮະຫວັດເຂດ ຕົວຢ່າງ: 02) _____

ລາຍເຊັນຂອງພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ _____ ວັນທີ _____

_____ / _____ / **2 0** _____



ໃຫ້ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ

ຊື່ຂອງນັກຮຽນ (ຕົວຢ່າງ: JANE SMITH)

ສໍາລັບຫ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ

ແຂນ ຊ້າຍ ເວລາຂອງການສັກຢາ (24ຊົ່ວໂມງ) ໝາຍເລກຂອງຢາສັກ ຂນາດຢາ 1

ຂວາ

ລາຍເຊັນຂອງພະຍາບານ

ວັນທີ

2 0

ແຂນ ຊ້າຍ ເວລາຂອງການສັກຢາ (24ຊົ່ວໂມງ) ໝາຍເລກຂອງຢາສັກ ຂນາດຢາ 2

ຂວາ

ລາຍເຊັນຂອງພະຍາບານ

ວັນທີ

2 0

ຄວາມເຫັນຂອງພະຍາບານ

ເຫັນຜົນທີ່ບໍ່ສັກຢາ

 ຂາດໂຮງຮຽນ ປະຕິເສດ ບໍ່ສະບາຍ ບໍ່ມີລາຍເຊັນ ຖອນການຍື່ນຍອມ ອື່ນໆ

ບັນທຶກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກໂປລີໂອ

ໃຫ້ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ

ຊື່ຂອງນັກຮຽນ (ຕົວຢ່າງ: JANE SMITH)

ສໍາລັບຫ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ

ແຂນ ຊ້າຍ ເວລາຂອງການສັກຢາ (24ຊົ່ວໂມງ) ໝາຍເລກຂອງຢາສັກ

ຂວາ

ລາຍເຊັນຂອງພະຍາບານ

ວັນທີ

2 0

ບັນທຶກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກໂປລີໂອ

ຂນາດຢາ 2

ໃຫ້ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຂຽນຕື່ມ

ຊື່ຂອງນັກຮຽນ (ຕົວຢ່າງ: JANE SMITH)

ສໍາລັບຫ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ

ແຂນ ຊ້າຍ ເວລາຂອງການສັກຢາ (24ຊົ່ວໂມງ) ໝາຍເລກຂອງຢາສັກ

ຂວາ

ລາຍເຊັນຂອງພະຍາບານ

ວັນທີ

2 0

ຄຳຖແລງ ເລື່ອງ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ



ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໂດຍໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ຄຳຖແລງນີ້ຈະອະທິບາຍແກ່ທ່ານວ່າພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບທ່ານແລະລູກທ່ານ ດ້ວຍວິທີໃດ ແລະ ເປັນຫຍັງ, ທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ ແລະ ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຖືກນຳໃຊ້ແບບໃດພາຍໃນບໍຣິການອະນາໄມຊຸມຊົນຣັດ ນຊວ ຫຼື ຈະຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ພາກສ່ວນອື່ນໆແບບໃດ. ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຮວມທັງຮາຍລະອຽດສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບທ່ານ ແລະ ລູກທ່ານ ແລະ ທັງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວດ້ານສຸຂະພາບທີ່ພົວພັນກັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຂອງລູກທ່ານ.

ການເກັບກຳ

ຂໍ້ມູນສ່ວນໄດ້ຖືກເກັບກຳເອົາໄວ້ກໍເພື່ອວ່າລູກທ່ານຈະສາມາດໄດ້ຮັບບັນດາບໍຣິການການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກທີ່ເໝາະສົມ.

ມີພຽງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວພັນແລະຈຳເປັນສຳລັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຂອງລູກທ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພື່ອນຳມາໃຊ້ໃນວຽກງານບໍຣິຫານ ການບໍຣິການ ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຖືກເກັບກຳ.

ຂໍ້ມູນຈະຖືກເກັບກຳຈາກທ່ານແລະລູກທ່ານໂດຍກົງຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້. ຂໍ້ມູນນີ້ອາດຈະຖືກເກັບກຳມາຈາກໂຮງຮຽນຂອງລູກທ່ານແລະຈາກນັກວິຊາການດ້ານສຸຂະພາບອື່ນໆຊຶ່ງໄດ້ເຄີຍຮັກສາລູກທ່ານ. ໃນກໍຣະນີສຸກເສີນ ຂໍ້ມູນກໍຍັງອາດຈະຖືກເກັບກຳຈາກສະມາຊິກຄອບຄົວອື່ນຄົນນຶ່ງ ຈາກໝູ່ເພື່ອນ ຜູ້ໃຫ້ການ ດູແລ ຫຼື ຄົນອື່ນໆທີ່ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການໃຫ້ການຮັກສາທີ່ດີທີ່ສຸດແກ່ລູກທ່ານ.

ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຖືກເກັບກຳມາ

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອາດຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນຫາຍວິທີທາງ. ຕາມທັມມະດາສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ຂໍ້ມູນນີ້ອາດຈະຖືກເກັບໄວ້ແບບເປັນເຈ້ຍບັນທຶກສຸຂະພາບ ແລະ/ຫຼື ເປັນບັນທຶກທາງການແພດແບບອີເລັກໂທຣນິກຊຶ່ງປະກອບເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ມູນທາງຄອມພິວເຕີທີ່ປອດໄພ. ພວກເຮົາເຮັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເກັບມ້ຽນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທຸກຮູບແບບໃຫ້ປອດໄພຢ່າງເຄັ່ງຄັດເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈາກການເສີຍຫາຍ, ການຖືກເຂົ້າເບິ່ງ ແລະ ການຖືກນຳໃຊ້ ໂດຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ການນຳໃຊ້ ແລະ ການເປີດເຜີຍ

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຫຼື ຂອງລູກທ່ານອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ໂດຍ ບໍຣິການ ອະນາ ໄມຊຸມຊົນຣັດ ນຊວ, ຫຼື ຖືກເປີດເຜີຍອອກໄປຂ້າງນອກ ບໍຣິການ ອະນາໄມ, ເພື່ອສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການດູແລແລະການປິ່ນປົວອັນເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ຕົວ ຢ່າງເຊັ່ນ, ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ ຫຼື ເປີດເຜີຍຕໍ່ນາຍໝໍຂອງທ່ານ, ບໍຣິ ການການປິ່ນປົວສຸຂະພາບອື່ນໆ ຫຼື ໂຮງໝໍ, ບໍຣິການ ຣົດໂຮງໝໍ ຣັດ ນຊວ, ຕໍ່ ນາຍໝໍ ຊ່ຽວຊານພິເສດສະເພາະເພື່ອເອົາການແນະນຳສັ່ງຕໍ່ ຫຼື ເພື່ອເຮັດການກວດເລືອດ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວນີ້ກໍຍັງອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ ແລະ ເປີດເຜີຍເພື່ອ ຈຸດປະສົງທີ່ກ່ຽວພັນກັບການດຳເນີນການຂອງບໍຣິການ ອະນາໄມ ຣັດ ນຊວ ແລະ ການປິ່ນປົວຮັກສາຄົນໄຂ້ນອກຂອງພວກເຮົາ, ກວມເຖິງ ກອງທຶນ, ການ ວາງແຜນ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະ ບັນດາກິຈກັມຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຕ້ອງຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ທ້ອງການຕ່າງໆຂອງ ຣັຖບານ ຣັດ ແລະ ຣັຖບານກາງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ບັນດາກົດໝາຍກ່ຽວກັບການລາຍງານເລື່ອງ ພະຍາດ ຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ທາງການ, ເພື່ອໃຫ້ລາຍລະອຽດຕໍ່ ແມດິແຄຣ໌ ແລະ ສະຖິຕິຂອງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ.

ພວກເຮົາຍັງອາດຈະຕ້ອງນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ເພື່ອຕິດຕໍ່ທ່ານກ່ຽວກັບ ການສໍາຫຼວດເລື່ອງຄວາມ ພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ ແລະ ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງຄວາມປອດໄພ ຂອງ ຢາວັກຊີນ. ການເຂົ້າຮ່ວມ ນີ້ແມ່ນເປັນການສມັກ ໃຈ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຮ່ວມກໍຈະບໍ່ກະທົບກະເທືອນຕໍ່ການ ດູແລ ສຸຂພາບທີ່ໄດ້ເອົາໃຫ້ແລ້ວ.

ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ

ທ່ານມີສິດໃນການຂໍເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານທີ່ພວກເຮົາ ກັບມ້ຽນໄວ້ ແລະ ຂອງລູກທ່ານອີກນໍາ. ທ່ານອາດຈະ ຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມຖ້າທ່ານຕ້ອງການສໍາເນົາຂອງຂໍ້ມູນ ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນທຶກທາງການແພດ.

ເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມເລື່ອງວ່າ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງ ທ່ານຈະຖືກຈັດການຢ່າງໃດ, ກະຮຸນາເບິ່ງ ປຶ້ມຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວດ້ານສຸຂພາບ ຂອງ ຣັດ ນຊວ ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂພາບ: www.health.nsw.gov.au/patients/privacy

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫຼື ມີການຮ້ອງຮຽນໃດໆ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ກະ ຮຸນາຕິດຕໍ່ ພະແນກ ອະນາໄມຊຸມຊົນ ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງ ທ່ານ ຕາມໂທຣະສັບໝາຍເລກ 1300 066 055.