



ການຍິນຍອມທາງອອນລາຍແມ່ນມີໃຫ້ສໍາລັບການສັກຢາວັກຊີນຂອງໂຮງຮຽນ

ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ດູແລສາມາດໃຫ້ການຍິນຍອມທາງອອນລາຍສໍາລັບການສັກຢາວັກຊີນໃນໂຮງຮຽນປົກກະຕິຂອງລູກເຂົາເຈົ້າເມື່ອເຂົາເຈົ້າຢູ່ຊັ້ນປີ 7.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການສັກຢາວັກຊີນຂອງໂຮງຮຽນ ຮັດ NSW ຈົ່ງເຂົ້າໄປເບິ່ງທີ່ health.nsw.gov.au/schoolvaccination

ທ່ານຈະຕ້ອງການ:

1. ລາຍລະອຽດການເຂົ້າສູ່ລະບົບ Service NSW ຂອງທ່ານ
2. ນໍາເບີ ບັດ Medicare ຂອງທ່ານ ຂອງລູກທ່ານ (ຖ້າມີທັງສອງຄົນ)
3. ລາຍລະອຽດຂອງໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມທີ່ລູກຂອງທ່ານເຂົ້າຮຽນໃນປີ 2024

ເພື່ອຕ້ອງການໃຫ້ການຍິນຍອມທາງອອນລາຍ ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ <https://engage.health.nsw.gov.au/engage>

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:



ໂຄງການສັກຢາວັກຊີນ ຂອງ ຊັ້ນ ປີ 7 ຂອງໂຮງຮຽນ ຮັດ NSW

ຂໍ້ມູນສໍາຄັນ 2024

ໂຄງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຢູ່ໃນ ໂຮງຮຽນ ຂອງຣັດ NSW



ກຣົມອະນາມັຍຂອງຣັດ NSW ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໂຮງຮຽນທັງຫຼາຍເພື່ອສະເໜີການ ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກໄວຣັສທີ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດເນື້ອງອກເຍື່ອບຸຜົວໃນມະນຸດ (HPV) ແລະ ໂຮກຄໍຕີບ-ໂຮກບາດທະຍັກ ແລະ ໂຮກໄອໄກ່ (dTpa) ໃຫ້ແກ່ ບັນດາ ນັກຮຽນ Year 7 ຕາມໂຄງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກສໍາລັບພວກວັຍໜຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ. ຢາວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກ ແນະນຳໂດຍ ສະພາ ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານສຸຂະພາບແລະຢາແຫ່ງຊາດ (NHMRC) ແລະໄດ້ຮັບທຶນພາຍໃຕ້ໂຄງການສັກຢາ ປ້ອງກັນໂຮກແຫ່ງຊາດ.

- ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາຢາສັກ ແລະ ບັນດາພະຍາດຕ່າງໆທີ່ຢາພວກນີ້ປ້ອງກັນ ໄດ້ ຖືກຮວມເອົາໄວ້ຢູ່ໃນເຈ້ຍຂໍ້ມູນສໍາລັບພໍ່ແມ່ໃບນີ້.
- ເພື່ອຈະໃຫ້ລູກທ່ານໄດ້ສັກຢາ ການຍິນຍອມຂອງທ່ານຕ້ອງສົ່ງໄປທາງອອນລາຍ ຫຼື ໃນຟອມຍິນຍອມທີ່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້. ຢາສັກນີ້ຈະມີໃຫ້ຟຣີຢູ່ໃນໂຮງຮຽນເທົ່ານັ້ນ ຖ້າທ່ານໃຫ້ການຍິນຍອມທາງອອນລາຍ ຫຼື ຂຽນຕື່ມແບບຟອມ ໃຫ້ເຊັນຊີຮັບແລະສົ່ງຄືນໄປ ໃນຂະນະທີ່ລູກທ່ານຮຽນຢູ່ຊັ້ນ ປີ 7.
- ການຍິນຍອມສາມາດຖືກຖອນ ໄດ້ທຸກເວລາດ້ວຍການເຮັດຕາມຄໍາແນະນຳທີ່ຢູ່ໃນໜ້າ 2.
- ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ລູກທ່ານສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກໃດນຶ່ງນີ້ຢາເຊັນຊີທ່ານໃສ່ຢູ່ໃກ້ຊື່ຂອງຢາວັກຊີນນັ້ນ.
- ສໍາເນົາຄໍາຖະແຫຼງການເລື່ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ອະທິບາຍວ່າຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານເອົາໃຫ້ຈະຖືກເກັບກໍາ ແລະ ນໍາໃຊ້ແບບໃດກໍຍັງຖືກລວມໄວ້ໃນໜ້າ 4.

ເພື່ອຈະໃຫ້ການຍິນຍອມທາງອອນໄລນ໌ ເຂົ້າຢ້ຽມເບິ່ງ <https://engage.health.nsw.gov.au/engage>



ຄໍາຖາມທີ່ຄົນມັກຖາມເລື້ອຍໆ

ຖ. ຢາວັກຊີນທຳການຢ່າງໃດ?

ຢາວັກຊີນທຳການໂດຍການໄປກະຕຸ້ນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດເຊື້ອໂຮກບາງຢ່າງ. ຖ້າວ່າຄົນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກແລ້ວມີການສຳຜັດກັບການຕິດເຊື້ອໂຮກເຫຼົ່ານີ້ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງພວກເຂົາກໍ່ຈະສາມາດຕອບຮັບໄດ້ໂດຍມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງການປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອໂຮກ ຫຼື ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງມັນໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ຖ. ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກປອດໄພເທົ່າໃດ?

ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍນີ້ແມ່ນປອດໄພຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານການກວດກາຢ່າງເຄັ່ງຄັດໂດຍອົງການຄວບຄຸມຢາເພື່ອການບຳບັດ (TGA) ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ອົງການ (TGA) ຍັງໄດ້ຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພຂອງຢາສັກໃນເວລາທີ່ຖືກນຳໃຊ້ອີກດ້ວຍ.

ຖ. ອາການຂ້າງຄຽງຂອງການສັກຢາກັນໂຮກ ມີຫຍັງແດ່?

ອາການຂ້າງຄຽງ ມີພຽງເບົາບາງ ແລະ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຈະມີອາການເຈັບໃຄ່ ແລະ ເປັນຮອຍແດງຕາມບໍຣິເວນສັກຢາ. ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ຮ້າຍແຮງນັ້ນມີນ້ອຍທີ່ສຸດ. ບັນດາພໍ່ແມ່ທີ່ຢູ່ໃນຮັດ NSW ທີ່ໄດ້ຖືກຕິດຕາມເບິ່ງຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກ HPV ໄດ້ລາຍງານວ່າ ນັກຮຽນ 9.7% ມີອາການຂ້າງຄຽງທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ ໃນຂະນະທີ່ມີພຽງ 0.5% ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຕ້ອງການການຮັກສາພະຍາບານ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆ ມີໄວ້ໃຫ້ທີ່ ກອງຂໍ້ມູນເລື່ອງຢາ ສຳລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ [Consumer Medicine Information (CMI)] ສຳລັບຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກແມ່ນມີໄວ້ທີ່ health.nsw.gov.au/schoolvaccination

ບັນດາພໍ່ແມ່ທີ່ເປັນກຸ່ມກ່ຽວກັບອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆຫຼັງຈາກການສັກຢານັ້ນ ຄວນຕິດຕໍ່ນາຍໝໍຂອງພວກເຂົາຜູ້ຊຶ່ງຈະເປັນຜູ້ລາຍງານໄປຫາພະແນກສຸຂພາບ ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ.

ຖ. Anaphylaxis (ອາການແພ້ຢາງຮຸນແຮງ) ແມ່ນຫຍັງ?

Anaphylaxis ແມ່ນອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສລົບ ແລະ ຕາຍໄດ້ຖ້າບໍ່ປິ່ນປົວໃຫ້ໄວ. ມັນຈະເກີດໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ ຫຼັງຈາກການສັກຢາ. ພວກພະຍາບານທີ່ເຮັດວຽກດ້ານ ການສ້າງພູມຕ້ານທານໂຮກຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນກໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກຫັດມາແລ້ວເປັນຢ່າງດີໃນການປິ່ນປົວອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງນີ້.

ຖ. ຖ້າລູກຂ້ອຍເປັນໂຮກຫິດ ແລະ ກິນຢາ ກອັກຕີໂຊນ ຫຼື ເປຣັດນີໂຊນ ດ້ວຍການໃຊ້ “ອັນເປີ້” ເດ?

ຢາວັກຊີນ ສາມາດສັກໃຫ້ໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ເປັນໂຮກຫິດໄດ້ໂດຍປອດໄພ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະພວມກິນຢາຫຍັງ.

ຖ. ຄວນສັກຢາກັນໂຮກນີ້ແກ່ນັກຮຽນຍິງທີ່ຖືພາຫຼື ຄິດວ່າລາວອາດຈະຖືພາ ບໍ່?

ບໍ່. ນັກຮຽນຍິງຜູ້ໃດທີ່ຖືພາ ຫຼື ຄິດວ່າລາວອາດຈະຖືພາບໍ່ຄວນສັກຢາກັນໂຮກນີ້. ໃນວັນທີ່ເປີດຄລິນິກພະຍາບານສັກຢາຈະຖາມບັນດານັກຮຽນຜູ້ຍິງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຖືພາ ຫຼື ຄິດວ່າອາດຈະຖືພາຫຼືບໍ່. ຖ້າຄຳຕອບຂອງນັກຮຽນຕໍ່ຄຳຖາມນີ້ວ່າ ແມ່ນ ລາວກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ສັກຢາ.

ນັກຮຽນກໍ່ຈະຖືກແນະນຳໃຫ້ປຶກສາຫາລື ບັນຫານີ້ກັບພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງຂອງລາວ ແລະ ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການແພດໃນທັນທີ. ນອກຈາກນີ້ລາວຍັງຈະໄດ້ຮັບຮາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ຂອງບໍຣິການການສົ່ງຕໍ່ດ້ານສຸຂພາບຊຶ່ງຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳການອຸ້ມຄູ ແລະ ການຊີ້ນຳ.

ຖ. ຂ້ອຍຈະຖອນຄຳຍິນຍອມໄດ້ບໍ່?

ການຍິນຍອມສາມາດຖອນໄດ້ທຸກເວລາ

- ຖ້າການຍິນຍອມໄດ້ຖືກສົ່ງທາງອອນໄລນ໌, ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບທີ່ <https://engage.health.nsw.gov.au/engage> ແລະປະຕິບັດຕາມການເຕືອນເພື່ອຖອນການຍິນຍອມສຳລັບລູກຂອງທ່ານ
- ຖ້າການຍິນຍອມໄດ້ຖືກ ສົ່ງໃນແບບຟອມການຍິນຍອມ, ກະລຸນາແຈ້ງທາງໂຮງຮຽນເຖິງ ການຖອນການຍິນຍອມໂດຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື ໂທຫາໂຮງຮຽນເພື່ອຖອນ ການຍິນຍອມກ່ອນທາງຄລິນິກ.

ຖ. ຖ້າຂ້ອຍຢາກລູກຈົນກວ່າລູກຂ້ອຍໃຫຍ່ກວ່ານີ້ ເດຈະເປັນຫຍັງບໍ່?

ຢາສັກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເອົາໃຫ້ໄດ້ຢູ່ພຽງແຕ່ໃນໂຮງຮຽນດ້ວຍການສົ່ງຕໍ່ສບັບຟອມ ຍິນຍອມໃນຂະນະທີ່ລູກທ່ານຮຽນຢູ່ Year 7 ເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າທ່ານເລືອກທີ່ຈະລໍຖ້າຈົນກວ່າລູກທ່ານໃຫຍ່ກວ່ານີ້ ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດນັດໝາຍສັກຢາກັບ ນາຍໝໍຂອງທ່ານ ຫຼື ເພສັດຊະກອນດ້ານພູມຕ້ານທານ. ກະລຸນາຮັບຊາບ, ອາດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຖ. ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າລູກຂ້ອຍພາດຈາກການສັກຢາທີ່ໂຮງຮຽນ?

ຈະມີຄວາມພະຍາຍາມທຸກໆທາງໃນການທີ່ຈະສັກຢາໃຫ້ລູກທ່ານໃນມື້ເປີດຄລິນິກ ພາຍໃນປີການຮຽນຂອງ Year 7 ຄັ້ງຕໍ່ມາ. ຖ້າຫາກວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເຖິງການຈັດການເລື່ອງການສັກຢາເພື່ອນຳໃຫ້ເຫັນ (catch-up). ອີກທາງນຶ່ງ, ວັກຊີນຟຣີ (catch-up) ແມ່ນມີໃຫ້ຜ່ານ ນາຍໝໍ ທ້ອງຖິ່ນແລະ ເພສັດຊະກອນດ້ານພູມຕ້ານທານຂອງຮ້ານຂາຍຢາ. ກະລຸນາສັງເກດ ວ່ານາຍໝໍ ແລະ ເພສັດຊະກອນດ້ານພູມຕ້ານທານ ອາດຈະຄິດຄ່າທຳນຽມການປຶກສາຫາລື ຫຼືການສັກຢານີ້.

ຖ. ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມພິການທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຫຼື ສະຕິປັນຍາສາມາດສັກວັກຊີນຢູ່ໂຮງຮຽນໄດ້ບໍ່?

ນັກຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມພິການທາງຮ່າງກາຍ ແລະ/ຫຼື ສະຕິປັນຍາສາມາດໄດ້ຮັບການສັກຢາຢູ່ໂຮງຮຽນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຮຽນບາງຄົນອາດຈະຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມໃນມື້ຂອງຄລິນິກຢູ່ໂຮງຮຽນ, ຫຼືການສົ່ງຕໍ່ໄປຫາຄລິນິກພິເສດດ້ານພູມຕ້ານທານທີ່ສະໜອງການສັກຢາປ້ອງກັນພາຍໃຕ້ການສັງເກດຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ຖ້າທ່ານເຊື່ອວ່າລູກຂອງທ່ານຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ ຫຼືການສົ່ງຕໍ່, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນຂອງຂອງທ່ານ ທ່ານ (PHU) ທີ່ເບີ 1300 066 055 ເພື່ອປຶກສາຫາລືເພີ່ມເຕີມ.

ຖ. ຂ້ອຍຈະເຂົ້າເຖິງບັນທຶກການສັກຢາໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນຂອງລູກທ່ານຈະຖືກອັບໂຫຼດໃສ່ທະບຽນສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ (AIR) ເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະຫວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງລູກທ່ານ.

ບັນດາພໍ່ແມ່ສາມາດຂໍສຳເນົາໃບລາຍງານປະຫວັດການສັກຢາ AIR ຂອງລູກພວກເຂົາໄດ້ທຸກເວລາ ຈົນຮອດລູກພວກເຂົາອາຍຸ 14 ປີຂຶ້ນໄປ, ແລະ ນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸ 14 ປີຂຶ້ນໄປສາມາດຂໍໃບປະກາດປະຫວັດການສັກຢາດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ນຳໃຊ້ບັນຊີ Medicare ຜ່ານ myGov <https://my.gov.au/>
- ນຳໃຊ້ແອັບ Medicare Express Plus App www.servicesaustralia.gov.au/express-plus-mobile-apps
- ໂທຫາສາຍສອບຖາມທົ່ວໄປ AIR ທີ່ເບີ 1800 653 809.

ບັນດານັກຮຽນຍິງທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ HPV - ໂດຍການເຊັນຟອມຍິນຍອມນັ້ນ, ແມ່ນທ່ານໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂພາບຂອງລູກທ່ານເພື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າຫາ ໂຄງການລົງທະບຽນການກວດມົດລູກແຫ່ງຊາດໃນອະນາຄົດ.

ຖ. ຂ້ອຍຈະຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໄດ້ຈາກໃສ?

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມມີໄວ້ໃຫ້:

- ໂດຍການເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຕ໌ຂອງກົມອະນາໄມແຫ່ງຮັດ ນຊວ ທີ່: www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
- ໂດຍການຕິດຕໍ່ ພະແນກ ອະນາໄມຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ທີ່ເບີ 1300 066 055

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນແຕ່ລະຢ່າງ

ໂຮກ ເນື້ອງອກເຍື່ອບຸຜິວໃນມະນຸດ (HPV)

ຖ. ໂຮກນີ້ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນແພ່ຜ່າຍໄດ້ຢ່າງໃດ?

ໄວຣັສເນື້ອງອກເຍື່ອບຸຜິວໃນມະນຸດ (HPV) ເປັນໄວຣັສທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທັງເພດຍິງແລະເພດຊາຍ. HPV ແພ່ຜ່າຍຜ່ານ ການສຳຜັດອະໄວຍະວະເພດໃນຂະນະທີ່ມີເພດສຳພັນກັບ ຄົນທີ່ມີເຊື້ອໄວຣັສນີ້ແລ້ວ. ເຊື້ອໄວຣັສນີ້ຈະຜ່ານເຂົ້າໄປທາງຜິວໜັງທີ່ຂາດພຽງເລັກນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດແພ່ຜ່າຍທາງເລືອດ ຫຼື ທາງນ້ຳອິນຯຂອງຮ່າງກາຍ. ຖ້າອະນາໄມສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ແຕ່ພຽງບາງສ່ວນ ເພາະ ວ່າ ມັນບໍ່ທໍາເອົາຜິວໜັງທຸກໆບ່ອນຂອງອະວັຍະວະເພດ.

ບໍ່ແມ່ນ HPV ທຸກປະເພດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້. ຫຼາຍຄົນທີ່ມີການຕິດເຊື້ອ HPV ຈະບໍ່ຮູ້ເລື່ອງນີ້.

HPV ບາງຊະນິດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຕຸ່ມຢູ່ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ. ນີ້ລວມເຖິງບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ (ປາກຊ່ອງຄອດ, ຊ່ອງຄອດ, ປາກມົດລູກ, ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ, ໜ່ວຍອັນທະ, ຮູທະວານ, ແລະ ບໍລິເວນທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງທະວານໜັກແລະອະໄວຍະວະເພດ(perineum)). ປົກກະຕິແລ້ວຕຸ່ມມັກຈະບໍ່ເຈັບປວດ, ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຄັນ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍຕົວ. ປະເພດຂອງ HPV ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຕຸ່ມແມ່ນເອີ້ນວ່າ 'ຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ' ເພາະວ່າພວກມັນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມະເຮັງ.

HPV ຊະນິດອື່ນໆແມ່ນເອີ້ນວ່າ 'ຄວາມສ່ຽງສູງ' ເພາະວ່າພວກມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຈຸລັງກ່ອນເປັນມະເຮັງຂະຫຍາຍ ຕົວໄດ້. ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະກາຍເປັນມະເຮັງຖ້າປະໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.

HPV ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງ 5% ທົ່ວໂລກ, ລວມທັງ:

- ເກືອບຈະໝົດທຸກກໍຣະນີຂອງມະເຮັງປາກໝົດລູກ ແລະ ການເປັນຫູດທີ່ອະວັຍະວະເພດ
- 90% ຂອງມະເຮັງທະວານໜັກ
- 78% ຂອງມະເຮັງທີ່ອະວັຍະວະເພດຍິງ
- 60% ຂອງມະເຮັງຄໍ (ມະເຮັງຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງຮູຄໍ, ລິ້ນ ແລະ ຕ່ອມທອນຊິລ)
- 25% ຂອງມະເຮັງປາກຊ່ອງຄອດ
- 50% ຂອງມະເຮັງທີ່ອະວັຍະວະເພດຊາຍ

ການສັກຢາໃຫ້ຜູ້ຊາຍຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເປັນມະເຮັງໃນ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ການເປັນຫູດທີ່ອະວັຍະວະເພດ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ມັນຍັງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນພວກຜູ້ຍິງຈາກການເປັນໂຮກມະເຮັງປາກມົດລູກອີກດ້ວຍ.

ຖ. ຢາວັກຊີນໃດ ທີ່ຈະຖືກນຳໃຊ້?

ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກ HPV ອັນດຽວ ທີ່ປ້ອງກັນໂຮກ HPV 9 ປະເພດ (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ແລະ 58).

ຖ. ລູກຂ້ອຍຕ້ອງສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ HPV ຈັກເຊັມ?

ການຄົ້ນຄວ້າສາກົນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຢາວັກຊີນ HPV ເຂັ້ມໜຶ່ງໃຫ້ການປົກປ້ອງຄືກັນກັບການສັກສອງເຂັ້ມ. ອີງຕາມຫຼັກຖານນີ້, ກຸ່ມທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການຂອງອອສເຕຣເລຍກ່ຽວກັບການສັກຢາກັນໂຮກ (ATAGI) ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ອອສເຕຣເລຍທັນປ່ຽນໄປສູ່ຕາຕະລາງວັກຊີນ HPV ຄັ້ງດຽວໃນປີ 2023.

ວັຍລຸ້ນບາງຄົນທີ່ມີພູມຕ້ານທານບົກພ່ອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແມ່ນຖືກແນະນຳໃຫ້ສັກວັກຊີນ HPV ສາມເຂັ້ມ ທີ່ຄລິນິກນາຍໝໍຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ຮ້ານຂາຍຢາທີ່ໃຫ້ບໍລິການສັກຢາ. ຕາຕະລາງຂະໜາດຢາ 3ເຂັ້ມ ຕ້ອງໃຫ້ມີຊ່ວງເວລາຫ່າງກັນ 2 ເດືອນລະຫວ່າງຢາ ເຂັ້ມ 1 ແລະ ເຂັ້ມ 2, ແລະ 4 ເດືອນລະຫວ່າງ ເຂັ້ມ 2 ແລະ ເຂັ້ມ 3.

ພາວະພູມຕ້ານທານບົກພ່ອງທີ່ສຳຄັນແມ່ນໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ມີ:

- ພູມຕ້ານທານຂັ້ນຕົ້ນ ຫຼື ຮອງ (ສານຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອໂຮກໃນຮ່າງກາຍ ເມັດເລືອດຂາວ B ແລະ ເມັດເລືອດຂາວ T ບົກພ່ອງທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ)
- ການຕິດເຊື້ອ HIV
- ຄົນທີ່ເປັນມະເຮັງ
- ການປູກຖ້າອະໄວຍະວະ
- ໂຮກແພ້ພູມຄຸ້ມກັນຕົວເອງ
- ການປິ່ນປົວດ້ວຍການກົດພູມຕ້ານທານທີ່ສຳຄັນ (ບໍ່ລວມ asplenia ຫຼື hyposplenia).

ຖ. ໃຜຄວນສັກວັກຊີນ?

ນັກຮຽນ Year 7 ທຸກຄົນຄວນໄດ້ສັກວັກຊີນ HPV ເຂັ້ມດຽວ.

ການກວດປາກມົດລູກແບບກັນກອງຢ່າງສມໍ່າ ສມື (ແຕ່ກ່ອນເອີ້ນວ່າແພັບສະເມັຍ) ກໍຍັງເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບບັນດາຜູ້ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາແລ້ວ, ເພາະວ່າວັກຊີນ ປ້ອງກັນໂຮກ HPV ນີ້ບໍ່ປ້ອງກັນທຸກໆປະເພດຂອງໂຮກ HPV ທີ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໂຮກມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ້.

ຜູ້ຍິງ ໝົດ ທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຈາກ 25 ປີທີ່ເຄີຍມີເພດສຳພັນມາແລ້ວ ຄວນມີການກວດປາກມົດລູກແບບກັນກອງໃນທຸກໆ 5 ປີ, ໂດຍ ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງສະຖານະການສັກ

ຢາປ້ອງກັນໂຮກ HPV ຂອງ ພວກເຂົາ.

ຖ. ແມ່ນໃຜທີ່ບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢາ?

ຢາວັກຊີນ HPV ບໍ່ຄວນສັກໃຫ້ຜູ້ທີ່:

- ຖືພາ ຫຼື ອາດຈະຖືພາ
- ເຄີຍມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຫຼັງຈາກການສັກຢາຄັ້ງກ່ອນ
- ເຄີຍມີປວດອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຕໍ່ເຊື້ອຢີດສ໌
- ເຄີຍມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຕໍ່ສ່ວນປະສົມໃດໜຶ່ງຂອງຢາສັກ (ເບິ່ງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ)

ຖ. ຢາສັກກັນໂຮກນີ້ບັນຈຸຫຍັງແດ່?

ວັກຊີນບັນຈຸສານເສີມໃນປະລິມານໜ້ອຍຫຼາຍ ເພື່ອຊ່ວຍວັກຊີນທຳການ ຫຼື ທຳໜ້າທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຢາເສີຍ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີເຊື້ອຢີດສ໌, ຢາເສີມອາລູມິນຽມ adjuvant, sodium chloride, L-histidine, polysorbate ແລະ sodium borate.

ຖ. ຢາວັກຊີນມີປະສິດທິຜົນເທົ່າໃດ?

ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກນີ້ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອປະເພດສຳຄັນຕ່າງໆຂອງໂຮກ HPV ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນໂຮກມະເຮັງປາກມົດລູກຫຼາຍກວ່າ 90 ສ່ວນຮ້ອຍໃນບັນດາຜູ້ຍິງແລະ ນອກ ຈາກນີ້ກໍຍັງປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອປະເພດ ອື່ນໆຕື່ມຂອງໂຮກ HPV ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນໂຮກມະເຮັງໃນບັນດາຜູ້ຊາຍອີກດ້ວຍ. ຢາວັກຊີນໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ສັກໃຫ້ ຕອນອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ສັກໃຫ້ແກ່ຄົນໃດຄົນໜຶ່ງກ່ອນທີ່ເຂົາຈະມີເພດສຳພັນ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ການແນະນຳໂຄງການການສັກຢາປ້ອງກັນ HPV ແຫ່ງຊາດ (ໃນປີ 2007 ສຳລັບແມ່ຍິງແລະ 2013 ສຳລັບຜູ້ຊາຍ) ປະກົດການຂອງ:

- ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງປາກມົດລູກລະດັບສູງໃນກຸ່ມອາຍຸທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບວັກຊີນຫຼຸດລົງເກືອບ 50%
- ຕຸ່ມຢູ່ອະໄວຍະວະເພດໃນວັຍໜຸ່ມສາວ (ຕ່ຳກວ່າ 21 ປີ) ຫຼຸດລົງ 90%.

ການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວັກຊີນດັ່ງກ່າວຍັງໃຫ້ການປ້ອງກັນເກືອບເຖິງ 100% ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຫລັງຈາກໄດ້ສັກຢາແລ້ວ. ຍ້ອນວ່າມະເຮັງປາກມົດລູກມັກຈະພັດທະນາໃນໄລຍະ 10 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ບົດບາດຂອງຢາວັກຊີນໃນການຫຼຸດຜ່ອນມະເຮັງປາກມົດລູກຈະບໍ່ປາກົດຜົນໃຫ້ເຫັນ ເປັນເວລາດົນພໍຄວນ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນແຕ່ລະຢ່າງ

ໂຮກ ຄໍຕິບ-ບາດທະຍັກ-ໄອໄກ່ (dTpa)

ຖ. ໂຮກນີ້ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນແພ່ຜາຍໄດ້ຢ່າງໃດ?

ໂຮກຄໍຕິບ ເປັນໂຮກຕິດຕໍ່ ແລະ ອາດເປັນອັນຕະຣາຍແກ່ຊີວິດ ທີ່ເກີດມາຈາກ ການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣີຍທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫາຍໃຈຍາກທີ່ສຸດ ຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວ ແລະ ຫໍາລາຍເສັ້ນປະສາດ. ຄົນທົ່ວໄປສາມາດຕິດໂຮກຄໍຕິບໄດ້ໂດຍການຫາຍໃຈເອົາເຊື້ອແບັກທີເຣີຍຈາກການໄອທີ່ຈາມຂອງຄົນທີ່ເປັນໂຮກນີ້ເຂົ້າໄປ, ຫຼືຈາກການຢູ່ໃກ້ຊິດກັບສິ່ງທີ່ຄົນເປັນໂຮກນີ້ໄດ້ປ່ອຍອອກມາຈາກປາກ, ດັງ, ລໍາຄໍ ຫຼື ຜິວໜັງ.

ໂຮກບາດທະຍັກ ເປັນໂຮກທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ເປັນໂຮກທີ່ເຖິງແກ່ຊີວິດຂອງຮະບົບປະສາດ. ຄົນທີ່ເປັນໂຮກນີ້ຈະມີຄວາມເຈັບປວດຢ່າງສາຫັດຈາກກ້າມເນື້ອທີ່ຫົດປົນການຊັກ ແລະ ຄາງກະໄຕແຂງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຮັກສາອັນທັນສະໄໝກໍຕາມ ປະມານ 1 ໃນ 10 ຄົນຈະຕາຍ. ໂຮກບາດທະຍັກ ເກີດມາຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣີຍທີ່ມາຈາກດິນ ແລະ ການຕິດໂຮກນີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ມີບາດແຜ ໃຫຍ່ ຫຼື ບາດແຜເລັກນ້ອຍ (ບາງຄັ້ງອາດຈະແມ່ນຮອຍແຫງທີ່ບໍ່ໄດ້ສັງເກດຢູ່ຜິວໜັງທີ່ຕິດເຊື້ອໂຮກຈາກດິນ ຝຸ່ນ ຫຼື ຈາກມູນສັດ).

ໂຮກໄອໄກ່ (ໄອທອບ) ເປັນໂຮກຕິດຕໍ່ອັນຮ້າຍແຮງດ້ວຍເຊື້ອແບັກທີເຣີຍທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການໄອເປັນລະຍະ. ບັນດາພວກ ວັຍຮຸ່ນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ອາດຈະມີອາການໄອທີ່ໜ້າລໍາຄານດົນເຖິງສາມເດືອນ. ລະຍະທີ່ໄອແບບຮ້າຍແຮງສາມາດເຮັດໃຫ້ຮາກກະດູກຂ້າງຫ່ານ ເສັ້ນເລືອດຝ່ອຍແຕກ ແລະ ໃສ່ເລື່ອນ. ປະມານ 1 ໃນ 125 ຂອງເດັກທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6 ເດືອນທີ່ຕິດໂຮກໄອໄກ່ຈາກຄົນທີ່ເປັນໂຮກນີ້ ຈະຕາຍເນື່ອງຈາກໂຮກປອດບວມ ຫຼື ສມອງເສື່ອມ. ໂຮກໄອໄກ່ ແພ່ຜາຍໄປຫາຄົນອື່ນໂດຍທາງ ຝ່ອຍນໍ້າຈາກການໄອ ຫຼື ຈາມ. ຄົນທີ່ເປັນໂຮກໄອໄກ່ນີ້ ຖ້າບໍ່ຮັກສາ ຄົນທີ່ເປັນໂຮກໄອໄກ່ກໍສາມາດແພ່ຜາຍໄປຫາຄົນອື່ນໄດ້ຫຼັງຈາກເລີ່ມຕົ້ນໄອໄປຈົນເຖິງ 3 ອາທິດ.

ຖ. ຢາວັກຊີນໃດ ທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້?

ຢາວັກຊີນແບບປະສົມທີ່ປ້ອງກັນໂຮກຄໍຕິບ-ບາດທະຍັກ-ໄອໄກ່ (dTpa) ຈະຖືກສະ ເໜີໃຫ້ແບບເປັນເຂັມດຽວເພື່ອໃຫ້ການປ້ອງກັນໂຮກຄໍຕິບ, ໂຮກບາດທະຍັກ ແລະ ໂຮກໄອໄກ່. ການສັກຢາເພີ່ມນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຮັກສາການມີ ພູມຕ້ານທານໄປສູ່ວັຍຜູ້ໃຫຍ່ຫຼັງຈາກການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກຄໍຕິບ-ບາດທະຍັກ-ໄອໄກ່ ຄັ້ງກ່ອນໃນວັຍເດັກ. ບັນດາເດັກທີ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນໂຮກ ຄໍຕິບ-ບາດທະຍັກ (ADT) ມາແລ້ວກໍສາມາດຮັບຢາວັກຊີນ dTpa ໄດ້ ເພື່ອປ້ອງກັນພວກເຂົາຈາກໂຮກໄອໄກ່.

ຖ. ໃຜຄວນສັກວັກຊີນ?

ນັກຮຽນທຸກຄົນທີ່ຢູ່ Year 7 ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢາ dTpa ວັກຊີນເພີ່ມ 1 ເຂັມ.

ຖ. ແມ່ນໃຜທີ່ບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢານີ້?

ຢາປ້ອງກັນໂຮກ dTpa ນີ້ບໍ່ຄວນສັກໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່:

- ເຄີຍມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຫຼັງຈາກການສັກຢາຄັ້ງກ່ອນ
- ເຄີຍມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຕໍ່ສ່ວນປະສົມໃດນຶ່ງຂອງຢາສັກ (ເບິ່ງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ)

ຖ. ຢາສັກກັນໂຮກນີ້ບັນຈຸຫຍັງແດ່?

ຢາສັກນີ້ ບັນຈຸ aluminium hydroxide ແລະ phosphate, formaldehyde ໜ້ອຍນຶ່ງ, polysorbate 80 ແລະ glycine ໄດ້ ສໍາ ຜັດກັບວັດສະດຸທີ່ອອກມາຈາກ bovine ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ.

ຖ. ຢາວັກຊີນມີປະສິດທິຜົນເທົ່າໃດ?

ຢາວັກຊີນມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນໂຮກຄໍຕິບ ແລະ ບາດທະຍັກ ແລະ ປະມານ 80% ໃນການປ້ອງກັນໂຮກໄອໄກ່.

ຄໍາຖາມ ເລື່ອງ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໂດຍໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ຄໍາຖາມນີ້ຈະອະທິບາຍແກ່ທ່ານວ່າພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບທ່ານແລະລູກທ່ານ ດ້ວຍວິທີໃດ ແລະ ເປັນຫຍັງ, ທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ ແລະ ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຖືກນຳໃຊ້ແບບໃດພາຍໃນບໍລິການອະນາໄມຊຸມຊົນຮັດ ນຊວ ຫຼື ຈະຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ພາກສ່ວນອື່ນໆແບບໃດ. ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຮວມທັງຮາຍລະອຽດສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບທ່ານ ແລະ ລູກທ່ານ ແລະ ທັງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວດ້ານສຸຂະພາບທີ່ພົວພັນກັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຂອງລູກທ່ານ.

ການເກັບກຳ

ຂໍ້ມູນສ່ວນໄດ້ຖືກເກັບກຳເອົາໄວ້ກໍເພື່ອວ່າລູກທ່ານຈະສາມາດໄດ້ຮັບບັນດາບໍລິການການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກທີ່ເໝາະສົມ.

ມີພຽງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວພັນແລະຈຳເປັນສຳລັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກຂອງລູກທ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພື່ອນຳມາໃຊ້ໃນວຽກງານບໍລິຫານ ການບໍລິການ ສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຖືກເກັບກຳ.

ຂໍ້ມູນຈະຖືກເກັບກຳຈາກທ່ານແລະລູກທ່ານໂດຍກົງຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້. ຂໍ້ມູນນີ້ອາດຈະຖືກເກັບກຳມາຈາກໂຮງຮຽນຂອງລູກທ່ານແລະຈາກນັກວິຊາການດ້ານສຸຂະພາບອື່ນໆຊຶ່ງໄດ້ເຄີຍຮັກສາລູກທ່ານ. ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ຂໍ້ມູນກໍຍັງອາດຈະຖືກເກັບກຳຈາກສະມາຊິກຄອບຄົວອີກຄົນນຶ່ງ ຈາກໝູ່ເພື່ອນ ຜູ້ໃຫ້ການ ດູແລ ຫຼື ຄົນອື່ນໆທີ່ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການໃຫ້ການຮັກສາທີ່ດີທີ່ສຸດແກ່ລູກທ່ານ.

ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຖືກເກັບກຳມາ

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອາດຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນຫຼາຍວິທີທາງ. ຕາມທົມມະດາສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ຂໍ້ມູນນີ້ອາດຈະຖືກເກັບໄວ້ແບບເປັນເຈັຍບັນທຶກສຸຂະພາບ ແລະ/ຫຼື ເປັນບັນທຶກທາງການແພດແບບອີເລັກໂທຣນິກຊຶ່ງປະກອບເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ມູນທາງຄອມພິວເຕີທີ່ປອດໄພ. ພວກເຮົາເຮັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ການເກັບມ້ຽນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທຸກຮູບແບບໃຫ້ປອດໄພ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈາກການເສັຍຫາຍ, ການຖືກເຂົ້າເບິ່ງ ແລະ ການຖືກນຳໃຊ້ ໂດຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ການນຳໃຊ້ ແລະ ການເປີດເຜີຍ

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຫຼື ຂອງລູກທ່ານອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ໂດຍ ບໍລິການ ອະນາໄມ ຊຸມຊົນຮັດ ນຊວ, ຫຼື ຖືກເປີດເຜີຍອອກໄປຂ້າງນອກ ບໍລິການ ອະນາໄມ, ເພື່ອສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການດູແລແລະການປິ່ນປົວອັນເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ ຫຼື ເປີດເຜີຍຕໍ່ນາຍໝໍຂອງທ່ານ, ບໍລິການ ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບອື່ນໆ ຫຼື ໂຮງໝໍ, ບໍລິການ ຮົດໂຮງໝໍ ຮັດ ນຊວ, ຕໍ່ ນາຍໝໍ ຊ່ຽວຊານພິເສດສະເພາະເພື່ອເອົາການແນະນຳສົ່ງຕໍ່ ຫຼື ເພື່ອເຮັດການກວດເລືອດ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວນີ້ກໍຍັງອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ ແລະ ເປີດເຜີຍເພື່ອ ຈຸດປະສົງທີ່ກ່ຽວພັນກັບການດຳເນີນການຂອງບໍລິການ ອະນາໄມ ຮັດ ນຊວ ແລະ ການປິ່ນປົວຮັກສາຄົນໄຂ້ນອກຂອງພວກເຮົາ, ກວມເຖິງ ກອງທຶນ, ການ ວາງແຜນ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະ ບັນດາກິຈກັມຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຕ້ອງຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ຫ້ອງການຕ່າງໆຂອງຮັຖບານ ຮັດ ແລະ ຮັຖບານກາງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍກ່ຽວກັບການລາຍງານເລື່ອງພະຍາດຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ທາງການ, ເພື່ອໃຫ້ລາຍລະອຽດຕໍ່ ແມດິແຄຣ໌ ແລະ ສະຖິຕິຂອງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ. ຂໍ້ມູນ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ HPV ຈະຖືກນຳເຂົ້າໄປໃສ່ຢູ່ໃນ ກອງທະບຽນໂຄງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກແຫ່ງຊາດ (AIR) ເຊື່ອມຕໍ່ຫາປວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ ຕັ້ງແຕ່ວັຍເດັກຂອງລູກທ່ານ, ແລະ ຈະຖືກຮວມ ເຂົ້າໃສ່ຢູ່ ໃນເອກະສານ ປວັດ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກ. ຂອງ AIR ໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກນີ້ໃນອະນາຄົດ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວພັນກັບນັກຮຽນຍິງກໍຈະຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ ກອງທະບຽນ ໂຄງການກວດມົດລູກແບບກັນກອງແຫ່ງຊາດ. ພວກເຮົາຍັງອາດຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເພື່ອຕິດຕໍ່ທ່ານກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດເລື່ອງຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ ແລະ ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງຄວາມປອດໄພ ຂອງ ຢາວັກຊີນ. ການເຂົ້າຮ່ວມ ນີ້ແມ່ນເປັນການສມັກໃຈ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຮ່ວມກໍຈະບໍ່ກະທົບກະເທືອນຕໍ່ການ ດູແລ ສຸຂະພາບທີ່ໄດ້ເອົາໃຫ້ແລ້ວ.

ການເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ

ທ່ານມີສິດໃນການຂໍເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານທີ່ພວກເຮົາເກັບມ້ຽນໄວ້ ແລະຂອງລູກທ່ານອີກນຳ. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງເສັຍຄ່າທຳນຽມຖ້າທ່ານຕ້ອງການສຳເນົາຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນທຶກທາງການແພດ.

ເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມເລື່ອງວ່າ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຈະຖືກຈັດການຢ່າງໃດ, ກະຮຸນາເບິ່ງ ປຶ້ມຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວດ້ານສຸຂະພາບ ຂອງຮັດ ນຊວ ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ: health.nsw.gov.au/patients/privacy

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມ ຫຼື ມີການຮ້ອງຮຽນໃດໆ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ກະຮຸນາຕິດຕໍ່ ພະແນກ ອະນາໄມຊຸມຊົນ ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ຕາມໂທຣະສັບໝາຍເລກ 1300 066 055.

