

تطعيم الأطفال ضد التهاب الكبد "ب"

Hepatitis B vaccination for babies

Arabic

التهاب الكبد "ب" (Hepatitis B) مرض شديد العدوى ينتقل عن طريق الدم أو السائل المنوي أو السائل المهبلي لأشخاص مصابين بالعدوى، ويمكن أن يسبب مرضاً في الكبد طويل الأجل، كتشمع الكبد (تليف الكبد) والفشل الكبدي وسرطان الكبد. ينبغي على جميع النساء الحوامل إجراء فحص الكشف عن التهاب الكبد "ب" من ضمن رعاية الحمل التي يحصلون عليها، ويتم ذلك بواسطة فحص دم. ولقاح التهاب الكبد "ب" هو أفضل وسيلة لمنع الإصابة بالمرض.

لقاح التهاب الكبد "ب" للأطفال

يعاني حوالي 90% من الأطفال الذين يصابون بالتهاب الكبد "ب" عند الولادة أو بعد الولادة بوقت قصير من التهاب الكبد "ب" طوال حياتهم.

إن لقاح التهاب الكبد "ب" يحمي الأطفال على المدى البعيد، وهو مجاني للأطفال.

ويتم تقديم لقاح التهاب الكبد "ب" إلى جميع الأطفال عند الولادة من أجل:

- المساعدة على منع انتشار العدوى من أم مصابة إلى طفلها، علماً أن الأمر قد لا تعلم أحياناً أنها تحمل المرض؛
 - منع انتشار المرض إلى الأطفال الرضع من أشخاص مصابين بالعدوى. على سبيل المثال، أشخاص يعيشون في ذات المنزل أو آخرون قد يكونوا مصابين.
- يُنصح بتلقيح جميع الأطفال ضد التهاب الكبد "ب" عند الولادة (أو خلال 7 أيام من ولادتهم). وينبغي أن يتلقى الأطفال أيضاً لقاح التهاب الكبد "ب" عند بلوغهم سن 6 أسابيع و4 شهور و6 شهور.
- ومن الضروري إتمام كامل جرعة لقاحات التهاب الكبد "ب" للحصول على الوقاية لأجلٍ طويل.
- ويُعطى لقاح التهاب الكبد "ب" بالإضافة إلى لقاحات أخرى موجودة على "جدول التحصين في نيو ساوث ويلز" (NSW immunisation schedule). ويوفّر "التلقيح في الموعد المحدد" (On-time vaccination) أفضل حماية للطفل ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها والأمراض الخطيرة.
- وتجدر الإشارة إلى أن جميع اللقاحات التي تُعطى للأطفال في أستراليا تخضع للاختبارات للتأكد من أمانها وفعاليتها.

الأطفال الذين يولدون من أمهات مصابات بالتهاب الكبد "ب"

يجب أن يتلقى الطفل الذي يولد من أم مصابة بالتهاب الكبد "ب" حقنة أخرى عند الولادة، تُدعى "الغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد ب"، بالإضافة إلى لقاح التهاب الكبد "ب"، لمنع الإصابة بالتهاب الكبد "ب".

ويظل من الواجب أن يتلقى الطفل الذي يولد من أم مصابة بالتهاب الكبد "ب" 3 جرعات إضافية من لقاح التهاب الكبد "ب" للتأكد من عدم تعرضه للإصابة بالتهاب الكبد "ب". ويجب أيضاً إجراء فحص دم للطفل بعد 3 شهور إلى 12 شهراً من إكماله لجرعة لقاح التهاب الكبد "ب" للتحقق من أنه أصبح يتمتع بالوقاية من هذا المرض.

وينبغي على الوالدين أو مقدمي الرعاية مراجعة مقدم الرعاية الصحية الذي يزورونه للمزيد من المعلومات والنصائح.

ويمكن أن تُنصح المرأة المصابة بالتهاب الكبد "ب" التي تكون حاملاً بمعالجة المرض خلال الحمل لخفض مخاطر نقل التهاب الكبد "ب" إلى الطفل. وعلى كل امرأة حامل تعرف أنها مصابة بالتهاب الكبد "ب" إخبار طبيبها أو طبيبتها بشأن إصابتها بالتهاب الكبد "ب".