

為嬰兒接種乙型肝炎疫苗

Hepatitis B vaccination for babies

Chinese Traditional

乙型肝炎傳染性很強，通過患者的血液、精液或陰道分泌物傳播，可能引起諸如肝硬化 (cirrhosis)、肝衰竭和癌症等慢性肝病。

所有孕婦都應通過驗血接受乙型肝炎篩查，作為孕期保健的一項措施。

接種乙型肝炎疫苗是預防乙型肝炎最好的方法。

嬰兒乙型肝炎疫苗

在出生時或出生後不久感染乙型肝炎的嬰兒，大約有90%會終身患上乙型肝炎。

乙型肝炎疫苗可以長期保護嬰兒。嬰兒接種疫苗是免費的。

所有嬰兒在出生時都要接種乙型肝炎疫苗：

- 有助於防止受感染的母親將乙型肝炎傳染給嬰兒。有時，母親可能不知道自己患有乙型肝炎；以及
- 防止已經受到感染的人——例如，住在同一套住宅的人或者可能已經受到感染的其他人——將疾病傳染給嬰兒。

建議所有嬰兒在出生時（或出生後 7 天內）接種乙型肝炎疫苗。嬰兒還應在 6 週大、4 個月大和 6 個月大時接種乙型肝炎疫苗。

為了長期得到保護，應該接種的乙型肝炎疫苗都一定要全部完成。

嬰兒在接種乙型肝炎疫苗的時仍可接受母乳餵養。

乙型肝炎疫苗與新州免疫接種計劃中的其他疫苗同時接種。按時接種疫苗是避免寶寶患上可以預防的重症的最佳措施。

澳大利亞兒童接種的所有疫苗都經過測試，以確保是安全、有效的。

乙型肝炎呈陽性的母親所生的嬰兒

乙型肝炎檢測呈陽性的母親所生的嬰兒，為了預防乙型肝炎，在出生時除了注射乙型肝炎疫苗之外，還需要注射另一種稱為“乙型肝炎免疫球蛋白”的針劑。

乙型肝炎檢測呈陽性的母親所生的嬰兒，仍然需要多打3針乙型肝炎疫苗，以確保不會感染乙型肝炎。在打完疫苗3至12個月之後，他們還需要驗血檢查是否得到保護。

家長或照顧者應該向醫療機構諮詢，獲得更多資訊和建議。

乙型肝炎女性患者如果懷孕了，那麼為了降低將乙型肝炎傳染給寶寶的風險，可能會建議其接受治療。如果孕婦知道自己患有乙型肝炎，那麼就應該把自己感染了乙型肝炎的情況告訴醫生。