

아기를 위한 B형 간염 예방 접종

Hepatitis B vaccination for babies

Korean

B형 간염은 전염성이 매우 높으며 감염된 사람의 혈액, 정액 또는 질액을 통해 전염됩니다. 이는 간경변(간 흉터), 간부전 및 암과 같은 장기적인 간 질환을 유발할 수 있습니다.

모든 임산부는 임신 관리의 일환으로 B형 간염 검사를 받아야 합니다. 이는 혈액 검사를 통해 이루어집니다.

B형 간염 예방 접종은 질병을 예방하는 가장 좋은 방법입니다.

아기용 B형 간염 백신

출생 시 또는 출생 직후 B형 간염에 감염된 아기의 약 90%는 평생 B형 간염이 진단됩니다.

B형 간염 백신은 장기적으로 아기를 보호합니다. 백신은 아기에게 **무료**입니다.

모든 아기는 출생 시 다음과 같은 이유로 B형 간염 백신을 맞습니다.

- 감염된 산모로부터 아기에게 질병 감염 예방에 도움. 때때로 산모는 자신이 이 병에 걸렸다는 사실을 모를 수도 있습니다. 그리고
- 감염된 사람으로부터 유아에게 질병 전파 방지. 예를 들어, 같은 집에 사는 사람이나 감염되었을 가능성이 있는 다른 사람들입니다.

모든 아기는 출생 시 (또는 출생 후 7일 이내에) B형 간염 예방 접종을 받도록 권장됩니다. 또한 아기는 생후 6주, 4개월, 6개월에 B형 간염 백신을 맞아야 합니다.

장기적인 보호를 위해 B형 간염 백신의 전 과정을 완료하는 것이 매우 중요합니다.

아기는 B형 간염 백신을 접종하는 동안 여전히 모유 수유를 할 수 있습니다.

B형 간염 백신은 NSW 예방 접종 일정에 따라 다른 백신과 함께 접종됩니다. 정시 예방 접종은 예방 가능한 심각한 질병으로부터 아기를 보호하는 가장 좋은 방법입니다.

호주에서 어린이에게 투여되는 모든 백신은 안전성과 효과를 확인하기 위해 테스트를 거칩니다.

B형 간염 양성 산모에게서 태어난 아기

B형 간염 양성 판정을 받은 산모에게서 태어난 아기는 B형 간염을 예방하기 위해 B형 간염 예방 접종과 함께 'B형 간염 면역글로불린'이라는 추가적 접종을 받아야 합니다.

B형 간염 양성 판정을 받은 산모에게서 태어난 아기는 B형 간염에 걸리지 않도록 B형 간염 백신을 3회 더 맞아야 합니다. 또한 백신 접종 과정을 마친 후 3-12개월 후에 혈액 검사를 통해 보호 여부를 확인해야 합니다.

부모 또는 보호자는 더 자세한 정보와 조언을 위해 의료 제공자와 상의해야 합니다.

임신 중인 B형 간염 여성은 아기에게 B형 간염을 전염시킬 위험을 줄이기 위해 임신 중 치료를 받도록 권장될 수도 있습니다. B형 간염에 걸렸다는 사실을 알고 있는 임산부는 의사에게 그 사실을 알려야 합니다.